

# ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

14. Wyznacz ekstrema lokalne funkcji: a)  $f(x, y) = x^3 - 2y^3 - 3x + 6y$ , b)  $f(x, y) = x^3 - 2x^2y^2 + y^4$ ,  
c)  $f(x, y, z) = \frac{2x^2}{y} + \frac{y^2}{z} - 4x + 2z^2$ .

Dane wejściowe:  $f(x, y) = x^3 - 2y^3 - 3x + 6y$

Krok 1: Ogólny wzór Aby znaleźć ekstremum lokalne funkcji dwóch zmiennych, musimy znaleźć miejsca, w których pochodne cząstkowe pierwszego rzędu funkcji są równe zero.

Krok 2: Pochodne cząstkowe pierwszego rzędu

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 - 2y^3 - 3x + 6y) = 3x^2 - 3$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 - 2y^3 - 3x + 6y) = -6y^2 + 6$$

Krok 3: Równanie do przekształcenia

$$f_x(x, y) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0$$

$$f_y(x, y) = 0 \Rightarrow -6y^2 + 6 = 0$$

Krok 4: Rozwiązanie równań

$$3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

$$-6y^2 + 6 = 0 \Rightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = \pm 1$$

Krok 5: Znalazienie punktów stacjonarnych Punkty stacjonarne to kombinacje  $(x, y)$ :

$$(1, 1), (1, -1), (-1, 1), (-1, -1)$$

Krok 6: Pochodne cząstkowe drugiego rzędu

$$f_{xx}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^3 - 2y^3 - 3x + 6y) = 6x$$

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^3 - 2y^3 - 3x + 6y) = -12y$$

$$f_{xy}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}(x^3 - 2y^3 - 3x + 6y) = 0$$

Krok 7: Wyznacznik Hessego Wyznacznik Hessego  $H$  dla funkcji dwóch zmiennych wynosi:

$$H(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$$

Krok 8: Obliczenia dla każdego punktu stacjonarnego

1. Punkt  $(1, 1)$ :

$$f_{xx}(1, 1) = 6, \quad f_{yy}(1, 1) = -12, \quad f_{xy}(1, 1) = 0$$

$$H(1, 1) = 6 \cdot (-12) - 0^2 = -72$$

2. Punkt  $(1, -1)$ :

$$f_{xx}(1, -1) = 6, \quad f_{yy}(1, -1) = 12, \quad f_{xy}(1, -1) = 0$$

$$H(1, -1) = 6 \cdot 12 - 0^2 = 72$$

3. Punkt  $(-1, 1)$ :

$$f_{xx}(-1, 1) = -6, \quad f_{yy}(-1, 1) = -12, \quad f_{xy}(-1, 1) = 0$$

$$H(-1, 1) = -6 \cdot (-12) - 0^2 = 72$$

4. Punkt  $(-1, -1)$ :

$$f_{xx}(-1, -1) = -6, \quad f_{yy}(-1, -1) = 12, \quad f_{xy}(-1, -1) = 0$$

$$H(-1, -1) = -6 \cdot 12 - 0^2 = -72$$

Krok 9: Analiza wartości Hessego - Dla  $(1, 1)$  i  $(-1, -1)$ :  $H < 0$ , brak ekstremum lokalnego. - Dla  $(1, -1)$  i  $(-1, 1)$ :  $H > 0$  -  $f_{xx}(1, -1) > 0$  — minimum lokalne w punkcie  $(1, -1)$  -  $f_{xx}(-1, 1) < 0$  — maksimum lokalne w punkcie  $(-1, 1)$

Wynik Końcowy

Punkty ekstremalne:

\*\*Minimum lokalne\*\* w punkcie  $(1, -1)$ .

\*\*Maksimum lokalne\*\* w punkcie  $(-1, 1)$ .