## ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

4. Znaleźć współrzędne środka ciężkości jednorodnej części kuli:  $x^2+y^2+z^2=a^2, \ x\geqslant 0, \ y\geqslant 0, \ z\geqslant 0.$ 

Dane:

Cześć kuli opisana jest równaniem:

$$x^{2} + y^{2} + z^{2} = a^{2}, \quad x \ge 0, \quad y \ge 0, \quad z \ge 0.$$

Środek cieżkości cześci kuli można obliczyć jako:

$$\bar{x} = \frac{1}{V} \iiint\limits_{D} x \, dV, \quad \bar{y} = \frac{1}{V} \iiint\limits_{D} y \, dV, \quad \bar{z} = \frac{1}{V} \iiint\limits_{D} z \, dV$$

gdzie V jest objetościa bryły D.

Objetość ćwiartki kuli (1/8 kuli) to:

$$V = \frac{1}{8} \cdot \frac{4}{3}\pi a^3 = \frac{1}{6}\pi a^3$$

Przejście do współrzednych sferycznych:

$$x = \rho \sin \theta \cos \phi, \quad y = \rho \sin \theta \sin \phi, \quad z = \rho \cos \theta$$
  
$$dV = \rho^2 \sin \theta \, d\rho \, d\theta \, d\phi$$

Zakresy zmian:

$$0 \le \rho \le a, \quad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \quad 0 \le \phi \le \frac{\pi}{2}$$

Obliczenie  $\bar{x}$ :

$$\bar{x} = \frac{1}{V} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^a (\rho \sin \theta \cos \phi) \rho^2 \sin \theta \, d\rho \, d\theta \, d\phi$$

$$= \frac{1}{V} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \phi \, d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta \, d\theta \int_0^a \rho^3 \, d\rho$$

$$= \frac{1}{V} \left[ \sin \phi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \left[ \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \left[ \frac{\rho^4}{4} \right]_0^a$$

$$= \frac{1}{V} \cdot 1 \cdot \frac{\pi}{8} \cdot \frac{a^4}{4}$$

$$= \frac{\pi a^4}{32V}$$

W analogiczny sposób obliczamy  $\bar{y}$  i  $\bar{z} \colon$ 

$$\bar{y} = \frac{\pi a^4}{32V}, \quad \bar{z} = \frac{\pi a^4}{32V}$$

Podstawiajac  $V = \frac{1}{6}\pi a^3$ , otrzymujemy:

$$\bar{x} = \frac{\pi a^4}{32 \cdot \left(\frac{1}{6}\pi a^3\right)} = \frac{3a}{8}$$
$$\bar{y} = \frac{3a}{8}, \quad \bar{z} = \frac{3a}{8}$$

Wynik końcowy:

$$\left(\frac{3a}{8}, \frac{3a}{8}, \frac{3a}{8}\right)$$