ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

4. Dwa ciała o masach m_1 i m_2 są połączone nieważką nicią przerzuconą przez bloczek. Bloczek, którego masę można zaniedbać jest zawieszony na dynamometrze umocowanym do sufitu. Oblicz z jakim przyspieszeniem poruszają się obie masy, jeżeli $m_1 > m_2$. Oblicz wartość siły, którą wskazuje dynamometr. Oblicz wskazania dynamometru oraz przyspieszenie ciał jeżeli $m_1 = 80$ kg, $m_2 = 20$ kg.

To zadanie wymaga zastosowania drugiej zasady dynamiki Newtona. Oto kroki do rozwiazania:

1. **Ustal układ równań:**

Dla masy m_1 :

$$m_1g - T = m_1a$$

Dla masy m_2 :

$$T - m_2 g = m_2 a$$

Gdzie: - T to siła naciagu nici (siła wskazywana przez dynamometr), - g to przyspieszenie ziemskie (przyjmijmy $g = 9,81 \,\mathrm{m/s}^2$), - a to przyspieszenie układu.

2. **Dodaj równania, aby znaleźć przyspieszenie a:**

Dodajemy oba równania:

$$m_1g - m_2g = m_1a + m_2a$$

$$(m_1 - m_2)g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{(m_1 - m_2)g}{m_1 + m_2}$$

3. **Podstaw wartości i oblicz przyspieszenie:**

$$a = \frac{(80 \text{ kg} - 20 \text{ kg}) \times 9,81 \text{ m/s}^2}{80 \text{ kg} + 20 \text{ kg}}$$
$$a = \frac{60 \times 9,81}{100}$$
$$a = \frac{588,6}{100}$$

$$a = 5,886 \,\mathrm{m/s}^2$$

4. **Znajdź siłe T:**

Podstaw przyspieszenie do jednego z równań, np. pierwszego:

$$T = m_1 g - m_1 a$$

$$T = 80 \times 9,81 - 80 \times 5,886$$

$$T = 784, 8 - 470, 88$$

$$T = 313,92 \,\mathrm{N}$$

^{**}Odpowiedź: ** - Przyspieszenie układu wynosi $5,886 \,\mathrm{m/s}^2$. - Wskazanie dynamometru to $313,92 \,\mathrm{N}$.