ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

- 4. Proton przyspieszany jest w cyklotronie o średnicy równej 0,5 m napięciem 10 kV. Indukcja pola magnetycznego wynosi 1 T. Oblicz:
 - a) wartość końcowej energii (nierelatywistycznej) jaka uzyska proton,
 - b) ile razy proton przejdzie między duantami,
 - c) ile okrążeń cyklotronu on wykona,
 - d) częstotliwość zmian przyspieszającego pola elektrycznego,
 - e) czas pobytu protonu w cyklotronie.

Rozwiażmy to zadanie krok po kroku.

Dane: - Średnica cyklotronu d=0.5 m promień R=0.25 m - Napiecie U=10 kV = 10^4 V - Indukcja pola magnetycznego B=1 T - Ładunek protona $q=1.6\times 10^{-19}$ C - Masa protona $m=1.67\times 10^{-27}$ kg

a) Wartość końcowej energii (nierelatywistycznej):

Proton uzyskuje energie równa ładunkowi razy napiecie za każdym razem, gdy przechodzi przez przestrzeń przyspieszajaca:

$$E = aU$$

Aby znaleźć maksymalna energie końcowa, można użyć wzoru:

$$E_k = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

Podstawiajac:

$$E_k = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2 \times (1)^2 \times (0.25)^2}{2 \times 1.67 \times 10^{-27}}$$

Oblicz

 E_k

b) Ile razy proton przejdzie miedzy duantami:

Każda zmiana energii o qU daje protonowi energie:

$$E = n \cdot qU$$

Podstawiajac maksymalna energie:

$$n = \frac{E_k}{qU}$$

Podstaw

 E_k

i oblicz

n

c) Ile okrażeń cyklotronu on wykona:

Po prostu n, ponieważ każde przejście miedzy duantami oznacza jedno okrażenie.

d) Czestotliwość zmian przyspieszajacego pola elektrycznego:

Czestotliwość cyklotronowa:

$$f = \frac{qB}{2\pi m}$$

Podstaw dane i oblicz f.

 $\ensuremath{^{**}\text{e}})$ Czas pobytu protonu w cyklotronie:**

Całkowity czas:

$$t = n \cdot \frac{1}{f}$$

Oblicz t używajac

7

i

f

.

Oblicz po kolei wartości dla poszczególnych kroków.