ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

a) Zbiornik zawierający gaz pod ciśnieniem 30 kPa połączono z pustym, dwukrotnie większym zbiornikiem. Oblicz ciśnienie w zbiornikach po wyrównaniu ciśnień (w stałej temperaturze)
b) Powietrze o temperaturze 20 °C zajmuje pewną objętość. Do jakiej temperatury należy je ogrzać aby przy tym samym ciśnieniu zajmowało dwukrotnie większą objętość?

To zadanie wymaga zastosowania podstawowych praw gazowych.

Cześć a: Mamy dwa zbiorniki: jeden o pojemności V i drugi, pusty, dwukrotnie wiekszy, czyli o pojemności 2V.

- 1. **Zasada zachowania masy i stała liczba moli gazu**: Po połaczeniu zbiorników całkowita objetość to V+2V=3V.
- 2. **Równanie stanu gazu**: ciśnienie poczatkowe to $p_1 = 30 \,\mathrm{kPa}$.

Przy połaczeniu ciśnienie końcowe w stanie równowagi to:

$$p_2 \cdot 3V = p_1 \cdot V$$

Stad:

$$p_2 = \frac{p_1 \cdot V}{3V} = \frac{30 \,\text{kPa}}{3} = 10 \,\text{kPa}$$

Cześć b: Musimy zastosować prawo Charlesa:

1. **Dwie objetości**: $V_2 = 2V_1$. 2. **Prawo Charlesa**: $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$.

Dla $T_1=20^{\circ}\mathrm{C}=293\,\mathrm{K}$ i $V_2=2V_1$:

$$\frac{V_1}{293\,{\rm K}} = \frac{2V_1}{T_2}$$

Stad:

$$T_2 = 2 \cdot 293 \,\mathrm{K} = 586 \,\mathrm{K}$$

Podsumowanie: - Po wyrównaniu ciśnień osiagniemy 10 kPa. - Aby uzyskać dwukrotnie wieksza objetość przy stałym ciśnieniu, należy podgrzać gaz do 586 K, co odpowiada 313°C.