ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

2. W kartezjańskim układzie współrzędnych dane są dwa wektory $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ oraz

 $\mathbf{b} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, gdzie \mathbf{i} , \mathbf{j} , \mathbf{k} są wersorami osi tego układu. Znaleźć:

- a) długość każdego wektora,
- b) iloczyn skalarny **a**°**b**,
- c) kat zawarty między nimi,
- d) sume i różnice wektorów: $\mathbf{a} + \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \mathbf{b}$,

Żeby rozwiazać to zadanie, zróbny to krok po kroku:

Dane: - Wektor **
$$\mathbf{a}^{**} = 3\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$$
 - Wektor ** $\mathbf{b}^{**} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} + 3\mathbf{k}$

a) Długość każdego wektora: Długość wektora $\mathbf{v} = v_x \mathbf{i} + v_y \mathbf{j} + v_z \mathbf{k}$ obliczamy jako:

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

- Długość wektora **a**:

$$|a| = \sqrt{3^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 9 + 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

- Długość wektora **b**:

$$|b| = \sqrt{2^2 + 1^2 + 3^2} = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}$$

b) Iloczyn skalarny $a \cdot b$: Iloczyn skalarny dwóch wektorów $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$.

$$a \cdot b = 3 \cdot 2 + 3 \cdot 1 + (-3) \cdot 3 = 6 + 3 - 9 = 0$$

c) Kat zawarty miedzy nimi: Kat θ miedzy dwoma wektorami można obliczyć z równania:

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|}$$

Tutaj:

$$\cos\theta = \frac{0}{3\sqrt{3}\cdot\sqrt{14}} = 0$$

Skoro $\cos \theta = 0$, kat θ wynosi 90° (wektory sa prostopadłe).

- **d) Sume i różnice wektorów:**
- Suma $\mathbf{a} + \mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (3+2)\mathbf{i} + (3+1)\mathbf{j} + ((-3)+3)\mathbf{k} = 5\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 0\mathbf{k} = 5\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

- Różnica $\mathbf{a} - \mathbf{b}$:

$$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (3 - 2)\mathbf{i} + (3 - 1)\mathbf{j} + ((-3) - 3)\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$$

To powinno obejmować całe zadanie!