#### ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

- 5. Prędkość kuli o masie  $m = \frac{1}{2}$  kg poruszającej się prostoliniowo jest zależna od czasu w następujący sposób:  $V(t) = \frac{1}{2}$  t<sup>2</sup> 8.
  - a) Podaj równanie siły działającej na kulę,
  - b) Oblicz średnią prędkość kuli w czasie ruchu kuli od chwili t = 0 do momentu zatrzymania.

"latex article amsmath

#### Dane wejściowe

Masa kuli:  $m = \frac{1}{2} \,\mathrm{kg}$ 

Predkość w funkcji czasu:  $V(t) = \frac{1}{2}t^2 - 8$ 

## a) Równanie siły działajacej na kule

Siła F jest zwiazana z przyspieszeniem a i masa m przez druga zasade dynamiki Newtona:

$$F = m \cdot a$$

Przyspieszenie a to pochodna predkości wzgledem czasu:

$$a(t) = \frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2}t^2 - 8 \right)$$

Wyliczamy pochodna:

$$a(t) = \frac{1}{2} \cdot 2t = t$$

Podstawiamy przyspieszenie do równania dla siły:

$$F(t) = m \cdot a(t) = \frac{1}{2} \cdot t = \frac{t}{2}$$

## b) Obliczanie średniej predkości kuli

Zatrzymanie kuli nastepuje, gdy V(t) = 0:

$$\frac{1}{2}t^2 - 8 = 0$$

Rozwiazujemy równanie kwadratowe:

$$\frac{1}{2}t^2 = 8t^2 = 16t = 4$$

Średnia predkość  $\overline{V}$  to całkowity przebyty dystans przez czas całkowity:

$$\overline{V} = \frac{\int_0^4 V(t) \, dt}{4}$$

Liczymy całke:

$$\int_0^4 V(t) \, dt = \int_0^4 \left( \frac{1}{2} t^2 - 8 \right) \, dt$$

$$= \left[\frac{1}{6}t^3 - 8t\right]_0^4$$

$$= \left(\frac{1}{6} \cdot 64 - 32\right) - (0 - 0)$$

$$= \frac{64}{6} - 32 = \frac{32}{3} - 32 = \frac{32 - 96}{3} = -\frac{64}{3}$$

$$\overline{V} = \frac{-\frac{64}{3}}{4} = -\frac{16}{3} \text{ m/s}$$

# Ostateczny wynik

Maksymalna siła działajaca na kule w momencie  $t=4\,\mathrm{s}$ :

$$F(4) = \frac{4}{2} = 2 \,\mathrm{N}$$

Średnia predkość kuli:

$$-\frac{16}{3}$$
 m/s