## ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

- **4.** Dane są wektory  $\mathbf{A} = (3, y, z)$ ;  $\mathbf{B} = (1, 3, -2)$  oraz  $\mathbf{C} = (2, -4, 1)$ .
  - a) Obliczyć y i z tak, by wektor **A** był prostopadły do wektorów **B** oraz **C**.
  - b) Obliczyć jaki kat tworzą wektory **B** i **C**?

To zadanie można rozwiazać w nastepujacy sposób:

a) Aby wektorA był prostopadły do wektorów B i C,jego iloczyny skalarne z tymi wektorami musza wynosić zero.

Iloczyn skalarny wektorów A i B:

$$3 \cdot 1 + y \cdot 3 + z \cdot (-2) = 0$$
$$3 + 3y - 2z = 0$$
$$3y - 2z = -3 \quad (1)$$

Iloczyn skalarny wektorów A i C:

$$3 \cdot 2 + y \cdot (-4) + z \cdot 1 = 0$$
  
 $6 - 4y + z = 0$   
 $-4y + z = -6$  (2)

Rozwiaż układ równań (1) i (2):

$$\begin{cases} 3y - 2z = -3\\ -4y + z = -6 \end{cases}$$

Z drugiego równania wyznacz z:

$$z = 4y - 6$$

Podstaw do pierwszego równania:

$$3y - 2(4y - 6) = -3$$
$$3y - 8y + 12 = -3$$
$$-5y = -15$$
$$y = 3$$

Podstaw y = 3 do wzoru na z:

$$z = 4 \cdot 3 - 6 = 12 - 6 = 6$$

Wartości y = 3 oraz z = 6.

b) Aby obliczyć kat miedzy wektorami B i C, używamy wzoru na cosinus kata:

$$\cos \theta = \frac{B \cdot C}{|B||C|}$$

Iloczyn skalarny wektorów B i C:

$$B \cdot C = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-4) + (-2) \cdot 1 = 2 - 12 - 2 = -12$$

Długość wektorów:

$$|B| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-2)^2} = \sqrt{1 + 9 + 4} = \sqrt{14}$$

$$|C| = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{4 + 16 + 1} = \sqrt{21}$$

Podstaw wartości do wzoru na cosinus:

$$\cos\theta = \frac{-12}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}}$$

Oblicz:

$$\cos\theta = \frac{-12}{\sqrt{294}}$$

Aby znaleźć kat  $\theta,$ oblicz arccosinus tego wyniku:

$$\theta = \arccos\left(\frac{-12}{\sqrt{294}}\right)$$

Możesz użyć kalkulatora, aby znaleźć dokładna wartość kata  $\theta.$