

3-1-1. 2월

- 정선해양조사에서 관측한 2월 용존산소 분석 결과 한국 동해 해역은 5.5 mL/L 내외, 서해 해역은 6~7.5 mL/L, 남해 해역은 5.5~6.5 mL/L 및 동중국해 북부해역은 4.5~6 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 동해 해역과 동중국해 북부해역에서 낮게 나타났다. 서해 해역은 연안역에서 높게 나타났으나 근해역에서는 낮게 나타났다. 남해 해역은 서부 해역에서 높게 나타났으나 동부해역은 낮게 나타났다.

- 50 m 수심의 용존산소는 한국 동해 해역은 5.5 mL/L 내외, 서해 해역은 6~6.5 mL/L, 남해 해역은 4.5~6 mL/L 및 동중국해 북부해역은 4.5~5.5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 남해 근해 및 제주도 해역에서 높게 나타난 것을 제외하고 한국 연근해역에서 대체로 낮게 나타났다.

3-1-2. 4/5월

- 정선해양조사에서 관측한 4/5월 용존산소 분석 결과 한국 동해 해역은 5~5.5 mL/L, 서해 해역은 6.5~7.5 mL/L, 남해 해역은 5.5~6.5 mL/L 및 동중국해 북부해역은 5~7 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 동해 해역은 대체로 낮게 나타났으며 서해 해역에서 중부 해역은 높게, 남부 해역은 낮게 나타났다. 남해와 동중국해 북부해역은 동부 해역에서 높게 나타났다.

- 50 m 수심의 용존산소는 한국 동해 해역은 4.5~5.5 mL/L, 서해 해역은 6~7 mL/L, 남해 해역은 5.5~6 mL/L 및 동중국해 북부해역은 5~5.5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 한국 연근해역에서 대체로 낮게 나타났으며 특히 동해 연근해역과 제주도 남동부해역에서 더 낮게 나타났다.

- 동중국해 북부해역의 용존산소는 5월 관측값으로써 동·서·남해 해역의 4월 관측값과는 시간적 차이가 있을 수 있다.

3-1-3. 6월

- 정선해양조사에서 관측한 6월 용존산소 분석 결과 한국 동해 해역은 4.5~5 mL/L, 서해 해역은 5.5~7 mL/L 및 남해 해역은 5~5.5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 동해 해역에서 낮게 나타났으나 서해와 남해 해역에서는 높게 나타났다.

- 50 m 수심의 용존산소는 동해 해역에서 4~4.5 mL/L, 서해 해역에서 5~6.5 mL/L 및 남해 해역에서 4.5~5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 제주도 동부 해역에서 높게 나타난 것을 제외하고 대체로 한국 연근해에서 낮게 나타났으며 특히 동해 해역에서 더 낮게 나타났다.

3-1-4. 8월

- 정선해양조사에서 관측한 8월 표층 용존산소 분석 결과 한국 동해 해역은 4~4.5 mL/L, 서해 해역은 5~5.5 mL/L, 남해 해역은 5 mL/L 내외 및 동중국해 북부해역은 4.5~5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 남해 해역에서 높게 나타난 것을 제외하고 한국 연근해역에서 대체로 낮게 나타났다.

- 50 m 수심의 용존산소는 동해 해역에서 3.5~4.5 mL/L, 서해 해역에서 4~6 mL/L, 남해 해역에서 3.5~4 mL/L 및 동중국해 북부해역에서 3~4 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 서해 중부해역에서 높게 나타난 것을 제외하고 대체로 한국 연근해에서 낮게 나타났으며 특히 동해 속초 근해 및 동중국해 북부해역에서 더 낮게 나타났다.

3-1-5. 10월

- 정선해양조사에서 관측한 10월 표층 용존산소 분석 결과 한국 동해 해역은 4.5 mL/L 내외, 서해 해역은 5 mL/L 내외 및 남해 해역은 5 mL/L 내외의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 동해 및 서해 해역에서 낮게 나타났으며 동해 연근해역이 더 낮게 나타났다. 남해 해역은 대체로 낮게 나타났으나 제주도 서부 및 동부 해역에서 높게 나타났다.

- 50 m 수심의 용존산소는 동해 해역에서 3~4 mL/L, 서해 해역에서 3.5~4.5 mL/L 및 남해 해역에서 3~4.5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 동해 해역에서 낮게 나타났으며 특히 속초 및 주문진 근해에서 더 낮게 나타났다. 서해 해역은 서해 중부 해역에서는 낮게 나타났으나 남부 해역에서는 높게 나타났다. 남해 해역은 대체로 낮게 나타났으나 남해 동남부 해역에서는 높게 나타났다.

3-1-6. 11/12월

- 정선해양조사에서 관측한 12월 표층 용존산소 분석 결과 한국 동해 해역은 4.5~5 mL/L, 서해 해역은 5~6 mL/L, 남해 해역은 5~5.5 mL/L 및 동중국해 북부해역은 4~5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 한국 연근해역에서 대체로 낮게 나타났으며 특히 동해 중부 연안역 및 동중국해 북부해역에서 더 낮게 나타났다.

- 50 m 수심의 용존산소는 동해 해역에서 3.5~4.5 mL/L, 서해 해역에서 4.5~5.5 mL/L, 남해 해역에서 4.5~5 mL/L 및 동중국해 북부해역에서 4.5~5 mL/L의 분포를 보였다. 평년에 비해 용존산소는 한국 연근해역에서 대체로 낮게 나타났으며 특히 동해 연근해역에서 더 낮게 나타났다.

- 동중국해 북부해역의 용존산소는 11월 관측값으로써 동·서·남해 해역의 12월 관측값과는 시간적 차이가 있을 수 있다.
-