

RICERCA OPERATIVA - PARTE I

ESERCIZIO 1. (8 punti) Sia dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \min \quad & x_2 \\ & -x_1 - 2x_2 \leq -2 \\ & x_1 - x_2 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Si eseguano i seguenti punti:

- si risolva il problema per via grafica;
- si scriva il problema in forma standard, si scriva il duale del problema in forma standard e lo si risolva per via grafica;
- si risolva il primale utilizzando il metodo del simplesso più opportuno e si visualizzi graficamente a ogni iterazione dove ci trova nel primale e nel duale;
- si esegua l'analisi di sensitività sul termine noto del secondo vincolo, visualizzando graficamente cosa succede agli estremi dell'intervallo individuato.

ESERCIZIO 2. (7 punti) Sia dato il seguente problema di PL

$$\begin{aligned} \max \quad & (2 - \alpha)x_1 + (1 - 2\alpha)x_2 \\ & x_1 - x_2 + x_3 = 1 \\ & -x_1 + x_2 + x_4 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{aligned}$$

Lo si risolva spiegando come varia la soluzione al variare di α .

ESERCIZIO 3. (6 punti) Si consideri un problema di PL in forma canonica con $S_{ott} \neq \emptyset$. Si dica se le seguenti affermazioni sono vere o false, **motivando la risposta**:

- S_{ott} è un insieme convesso;
- S_{ott} è un poliedro;
- se S_{ott} contiene infiniti punti, allora almeno due di questi punti sono vertici.

ESERCIZIO 4. (8 punti)

- (1) Si consideri una base ammissibile ma non ottima per un problema di PL. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:
 - A:** se si sceglie come variabile entrante in base quella con coefficiente di costo ridotto massimo, si garantisce che all'iterazione successiva il valore dell'obiettivo sia il più grande possibile ;
 - B:** se si sceglie come variabile entrante in base una con coefficiente di costo ridotto negativo, all'iterazione successiva la base non sarà più ammissibile;
 - C:** se si sceglie come variabile entrante in base una con coefficiente di costo ridotto positivo, si garantisce che all'iterazione successiva il valore dell'obiettivo sia maggiore rispetto a quello attuale;
 - D:** nessuna delle altre affermazioni è vera.
- (2) Sia B una base ottima di un problema di PL. Dire quale delle seguenti affermazioni è falsa:
 - A:** se B è non degenere per il duale, allora il primale ha un'unica soluzione ottima;
 - B:** se B è non degenere per il primale, allora il duale ha un'unica soluzione ottima;
 - C:** se B è degenere per il primale, allora il primale ha infinite soluzioni ottime;
 - D:** se B è degenere per il duale, allora il primale può avere infinite soluzioni ottime.
- (3) Sia B una base ottima non degenere per il primale, di un problema di PL. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:

- A:** l'intervallo in cui una perturbazione Δb di un termine noto mantiene ottima la base B non può avere lo 0 come estremo ;
- B:** l'intervallo in cui una perturbazione Δc del coefficiente di una variabile al di fuori di B mantiene ottima la base B non può avere lo 0 come estremo ;
- C:** l'intervallo in cui una perturbazione Δc del coefficiente di una variabile in B mantiene ottima la base B non può avere lo 0 come estremo ;
- D:** nessuna delle altre affermazioni è vera.
- (4) Si consideri un problema di PL con regione ammissibile un politopo. Dire quale delle seguenti affermazioni è vera:
- A:** cambiando la sua funzione obiettivo, posso rendere vuota la regione ammissibile del duale;
- B:** cambiando la sua funzione obiettivo, posso rendere illimitato il duale;
- C:** togliendo un vincolo, posso rendere vuota la regione ammissibile del duale;;
- D:** togliendo un vincolo, posso rendere illimitato il duale.