SERVIÇO DE SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
Centro Médico do Servidor Municipal

LAUDO MÉDICO

Endocrinologia e Metabologia

Paciente: Marisa Helena Duarte Lobo. Idade: faixa dos 40 anos. CID-10: E11, Diabetes mellitus tipo 2.

História clínica e evolução. Diabetes Mellitus tipo 2 diagnosticado há cerca de quinze anos, em seguimento irregular. Em uso crônico de insulinoterapia (NPH e Regular), com episódios de hipoglicemia quando usa a insulina regular, o que levou à suspensão desta. Queixa atual de dificuldade para perder peso e controle glicêmico subótimo. Tem também fatores de risco cardiovascular, como o tabagismo.

Tratamento atual. Insulina NPH 8-8-8 UI; Insulina Regular (suspensa devido a hipoglicemias); Metformina XR (Glifage XR) 500 mg 2-0-2; Clonazepam 20 gotas à noite; Amitriptilina 25 mg à noite; Omeprazol 20 mg/dia.

Exames laboratoriais recentes (01/06/2025). Hemoglobina glicada 7,9%; glicemia de jejum 148 mg/dL; creatinina 0,79 mg/dL; colesterol total 201 mg/dL; LDL 82 mg/dL.

Exame físico. Peso 77,1 kg; altura 1,59 m; IMC 30,5 kg/m² (obesidade grau I).

Justificativa clínica. DM2 de longa data, obesidade, uso prévio de múltiplas doses de insulina e dificuldade de controle, além de hipoglicemias relacionadas à insulina regular. Mantém controle glicêmico inadequado (HbA1c 7,9%) e risco cardiovascular elevado por tabagismo, obesidade e tempo de doença.

A semaglutida (análoga de GLP-1), com os nomes comerciais Ozempic ou Wegovy de 1 mg, é indicada para auxiliar no controle glicêmico, na redução de peso e na diminuição do risco cardiovascular, conforme diretrizes da ADA (American Diabetes Association), da EASD (European Association for the Study of Diabetes) e da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD 2025). O uso é de 1 mg semanal, contínuo. Pelo histórico de diabetes e obesidade, o uso é crônico e por período indefinido.

O uso de agonista de GLP-1 é especialmente recomendado em pacientes com excesso de peso e risco cardiovascular aumentado, como neste caso. Evidências robustas (estudo SUSTAIN-6) demonstram benefício cardiovascular, além de melhora significativa no controle glicêmico e perda ponderal.

Conclusão. Solicito avaliação para liberação de Semaglutida SC 1 mg semanal para esta paciente, como terapia adjuvante ao tratamento já instituído, visando melhorar o controle glicêmico, reduzir peso corporal e risco de complicações cardiovasculares e evitar hipoglicemias decorrentes do uso de insulina regular.

Serra Dourada, MS, 21 de agosto de 2025.

Dr. Henrique Salles Vidal
CRM/MS 90.333, RQE 90.334, Endocrinologia e Metabologia

SERVIÇO DE SAÚDE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
Centro Médico do Servidor Municipal

ATESTADO MÉDICO

Nome: Marisa Helena Duarte Lobo.

Atesto que a paciente faz acompanhamento clínico nesta unidade de saúde. É portadora de diabetes mellitus insulinodependente e está em tratamento de ansiedade, depressão e insônia há aproximadamente 15 anos, em uso regular das medicações prescritas. Mesmo assim, apresenta muitas vezes episódios de apreensão, angústia e crises de ansiedade, às vezes precisando de internação. Segue em acompanhamento clínico e com especialistas (psiquiatra e endocrinologista).

CID: Z00 / Z02.

Serra Dourada, MS, 10/07/2025.

Dr. Otávio Brandão Leite
Médico, CRM/MS 90.444