

# Atlases sacensības komandu olimpiādei "Baltijas ceļš"

2016. gada 17. septembris, Rīga (1. diena)

**Uzdevums 0.1 (BW.TST.2016.1):** Uz tāfeles uzrakstīti 2016 skaitļi:  $\frac{1}{2016}, \frac{2}{2016}, \frac{3}{2016}, \dots, \frac{2016}{2016}$ . Vienā gājienā atļauts izvēlēties jebkurus divus uz tāfeles uzrakstītos skaitļus  $a$  un  $b$ , tos nodzēst, un to vietā uzrakstīt skaitli  $3ab - 2a - 2b + 2$ . Noteikt, kāds skaitlis būs palicis uzrakstīts uz tāfeles pēc 2015 gājieniem!

**Uzdevums 0.2 (BW.TST.2016.2):** Doti tādi naturāli skaitļi  $m, n$  un  $X$ , ka  $X \geq m$  un  $X \geq n$ . Pierādīt, ka var atrast tādus divus veselus skaitļus  $u$  un  $v$ , ka  $|u| + |v| > 0$ ,  $|u| \leq \sqrt{X}$ ,  $|v| \leq \sqrt{X}$  un

$$0 \leq mu + nv \leq 2\sqrt{X}.$$

**Uzdevums 0.3 (BW.TST.2016.3):** Dots 2016-ās pakāpes polinoms  $P$  ar reāliem koeficientiem un kvadrātisks polinoms  $Q$  ar reāliem koeficientiem. Vai iespējams, ka polinoma  $P(Q(x))$  saknes ir tieši šie visi skaitļi:

$$-2015, -2014, \dots, -2, -1, 1, 2, \dots, 2016, 2017?$$

**Uzdevums 0.4 (BW.TST.2016.4):** Atrast visas funkcijas  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , kas definētas reāliem skaitļiem, pieņem reālas vērtības un kurām visiem reāliem  $x$  un  $y$  izpildās vienādība:

$$f(2^x + 2y) = 2^y f(f(x)) f(y).$$

**Uzdevums 0.5 (BW.TST.2016.5):** Doti reāli pozitīvi skaitļi  $a, b, c$  un  $d$ , kuriem izpildās vienādības

$$a^2 + ab + b^2 = 3c^2 \quad \text{un} \quad a^3 + a^2b + ab^2 + b^3 = 4d^3.$$

Pierādīt, ka

$$a + b + d \leq 3c.$$

**Uzdevums 0.6 (BW.TST.2016.6):** Dots naturāls skaitlis  $n$ , kuram var atrast pirmskaitli, kas ir mazāks nekā  $\sqrt{n}$  un kas nav  $n$  dalītājs. Virkne  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ir skaitļi  $1, 2, \dots, n$  sakārtoti kaut kādā secībā. Šai virknei atradīsim garāko augošo apakšvirkni  $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_k}$ , ( $i_1 < \dots < i_k$ ) un garāko dilstošo apakšvirkni  $a_{j_1} > \dots > a_{j_l}$ , ( $j_1 < \dots < j_l$ ). Pierādīt, ka vismaz viena no šīm divām apakšvirknēm  $a_{i_1}, \dots, a_{i_k}$  un  $a_{j_1}, \dots, a_{j_l}$  satur skaitli, kas nav  $n$  dalītājs.

**Uzdevums 0.7 (BW.TST.2016.7):** Nekur nekadzemes parlamentā visa darbība notiek komisijās, kuru sastāvā ir tieši trīs deputāti. Konstitūcija nosaka, ka jebkuru triju komisiju apvienojumā jābūt vismaz pieciem deputātiem. Komisiju saimi sauksim par *kliķi*, ja katrām divām no tām ir tieši divi kopīgi deputāti, bet, pievienojot šai saimei jebkuru citu komisiju, šis nosacījums vairs neizpildās. Pierādīt, ka divām dažādām kliķēm nevar būt vairāk par vienu kopīgu komisiju.

**Uzdevums 0.8 (BW.TST.2016.8):** Šaha festivālā piedalījās  $3n - 2$  dalībnieki, daži no tiem savā starpā izspēlēja vienu šaha partiju. Pierādīt, ka izpildās vismaz viens no šiem apgalvojumiem:

(A) Var atrast tādus  $n$  šahistus  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , ka  $A_i$  ir izspēlējis partiju ar  $A_{i+1}$  visiem  $i = 1, \dots, n - 1$ .

(B) Var atrast septiņus šahistus  $B_1, \dots, B_7$ , kuri cits ar citu nav spēlējuši, izņemot varbūt trīs pārus  $(B_1, B_2)$ ,  $(B_3, B_4)$  un  $(B_5, B_6)$ , kas katrs var gan būt, gan nebūt izspēlējuši šaha partiju.

**Uzdevums 0.9 (BW.TST.2016.9):** Skaitļi no 1 līdz 2016 ir sadalīti trīs (nešķeļošās) apakškopās  $A, B$  un  $C$ , katra no tām satur tieši 672 skaitļus. Pierādīt, ka var atrast trīs tādus skaitļus, katru no citas apakškopas, ka divu no tiem summa ir vienāda ar trešo.

**Uzdevums 0.10 (BW.TST.2016.10):** Uz bezgalīgas rūtiņu lapas ir novietoti bezgagliņi daudzi  $1 \times 2$  rūtiņu taisnstūri, to malas iet pa rūtiņu līnijām, un tie nesaskaras cits ar citu pat ne ar stūriem. Vai tiesa, ka atlikušo rūtiņu lapu var pilnībā noklāt ar  $1 \times 2$  rūtiņu taisnstūriem?

**2016. gada 18. septembris, Rīga (2. diena)**

**Uzdevums 0.11 (BW.TST.2016.11):** Vai kvadrātu, kura laukums ir 2015, var sagriezt ne vairāk kā piecos daudzstūros tā, lai no šiem daudzstūriem pēc tam varētu salikt taisnstūri, kura malu garumi ir naturāli skaitļi?

**Uzdevums 0.12 (BW.TST.2016.12):** Kādiem naturāliem skaitļiem  $m$  un  $n$  plaknē var atrast punktus  $A_1, A_2, \dots, A_n$  un  $B_1, B_2, \dots, B_m$ , kuri visi ir dažādi un jebkuram plaknes punktam  $P$  izpildās vienādība

$$|PA_1|^2 + |PA_2|^2 + \dots + |PA_n|^2 = |PB_1|^2 + |PB_2|^2 + \dots + |PB_m|^2?$$

**Uzdevums 0.13 (BW.TST.2016.13):** Plaknē izvēlēti 4 punkti  $A, B, C$  un  $X$  tā, ka izpildās nevienādības  $AX \leq BC$ ,  $BX \leq AC$  un  $CX \leq AB$ . Pierādīt, ka  $\angle BAC \leq 150^\circ$ .

**Uzdevums 0.14 (BW.TST.2016.14):**  $AK$  ir dažādmalu trijstūra  $ABC$  bisektrise, tajā ievilkta riņķa līnija pieskaras tā malām  $BC$  un  $AC$  attiecīgi punktos  $D$  un  $E$ .  $AD$  un  $BE$  krustojas punktā  $P$ . Pierādīt, ka taisnes  $PC$  un  $AK$  ir perpendikulāras.

**Uzdevums 0.15 (BW.TST.2016.15):** Trijstūrī  $ABC$   $\angle BAC = 60^\circ$ , tā augstumi  $AD$ ,  $BE$  un  $CF$  krustojas punktā  $H$ . Malu  $BC$ ,  $CA$  un  $AB$  viduspunkti ir attiecīgi  $K$ ,  $L$  un  $M$ . Pierādīt, ka nogriežņu  $AH$ ,  $DK$ ,  $EL$  un  $FM$  viduspunkti atrodas uz vienas riņķa līnijas.

**Uzdevums 0.16 (BW.TST.2016.16):** Kāda ir izteiksme

$$\text{LKD} (n^2 + 3, (n + 1)^2 + 3)$$

lielākā iespējamā vērtība naturāliem  $n$ ?

**Uzdevums 0.17 (BW.TST.2016.17):** Vai var atrast piecus tādus pirmskaitļus  $p, q, r, s, t$ , ka

$$p^3 + q^3 + r^3 + s^3 = t^3?$$

**Uzdevums 0.18 (BW.TST.2016.18):** Atrisināt veselos skaitļos vienādojumu sistēmu:

$$\begin{cases} a^3 = abc + 2a + 2c \\ b^3 = abc - c \\ c^3 = abc - a + b \end{cases}$$

**Uzdevums 0.19 (BW.TST.2016.19):** Pierādīt, ka vienādojumam

$$x^{2015} + y^{2015} = z^{2016}$$

ir bezgalīgi daudz atrisinājumu, kur  $x, y$  un  $z$  ir dažādi naturāli skaitļi.

**Uzdevums 0.20 (BW.TST.2016.20):** Kādiem naturālu skaitļu pāriem  $(a, b)$  izteiksme

$$(a^6 + 21a^4b^2 + 35a^2b^4 + 7b^6) (b^6 + 21b^4a^2 + 35b^2a^4 + 7a^6)$$

vērtība ir pirmskaitļa pakāpe?