

7.1.B. Atrisinājumu struktūras: Vispārīgie un atsevišķie pamatojumi

Ja kaut ko **var izdarīt** - pamato ar konkrētu piemēru, ja **nevar izdarīt** - ar vispārīgu spriedumu.

Apgalvojumi bieži ir par kādu nezināmu parametru n (vai a vai b). Ja parametrs n **eksistē** - Jūs (kā risinātājs) pats varat izvēlēties šo parametru.

Ja parametrs n **neeksistē** - Parametru izvēlas žūrija (Jūs olimpiādes risināšanas laikā nezināt kādu), un Jūsu spriedumam jāparāda, ka viņiem nekas nesanāks.

1.piemērs: Ir divu veidu pastmarkas - ar vērtību 5 centi un 21 cents.

(A) Pierādīt, ka ar šīm pastmarkām nevar apmaksāt 79 centus (neeksistē a un b , kam $5a + 21b = 79$).

(B) Pierādīt, ka visas summas, kas lielākas par 79, var apmaksāt (katram $n > 79$ eksistē a un b , ka $5a + 21b = n$).



2.piemērs: Naturālu skaitli $p > 1$ sauc par pirmskaitli, ja tam ir tieši divi dalītāji: 1 un pats p .

(A) Skaitlis 101 ir pirmskaitlis, jo katram naturālam d , ar kuru dalās 101, vai nu $d = 1$, vai $d = 101$. **(B)** Skaitlis 1001 nav pirmskaitlis, jo eksistē tāds naturāls d , ar kuru dalās 1001, ka $d > 1$ un $d < 1001$.