

Signale und Systeme Boxen

Florian Lubitz & Steffen Hecht

4. April 2018

1 Motivation, Wiederholung und Überblick

a

6

$$u_1(t) = 15 \text{ V} \sin(\pi t + \pi/3) + 60 \text{ V} \sin(10\pi t + \pi/3) = 0,5x(t) + 2y(t)$$

und damit $a = 0,5, b = 2$ und

$$u_2(t) := \mathcal{H}\{u_1(t)\} = \mathcal{H}\{0,5x(t) + 2y(t)\} \stackrel{??}{=}$$

2 Diskrete Signale

11

$$\begin{aligned}
 (b) \quad x[-k] &= \begin{cases} -\frac{1}{k}, & k \neq 0 \\ 0, & k = 0 \end{cases} \\
 (c) \quad x[k + k_0] &= x[k + 3] = \begin{cases} \frac{1}{k+3}, & k \neq -3 \\ 0, & k = -3 \end{cases} \\
 (d) \quad x[k - k_0] &= x[k - 3] = \begin{cases} \frac{1}{k-3}, & k \neq 3 \\ 0, & k = 3 \end{cases}
 \end{aligned}$$

12

$$\begin{aligned}
 x[k_0 - k] &= x[-(k - k_0)] \\
 &= x[(-k) + k_0]
 \end{aligned}$$

13

$$\text{mit } x[k_0 - k] = x[3 - k] = \begin{cases} \frac{1}{3-k}, & k \neq 3 \\ 0, & k = 3 \end{cases}$$

14

- $x[k]$ heißt gerades Signal, falls $x[k] = x[-k] \forall k \in \mathbb{Z}$ gilt.
- $x[k]$ heißt ungerades Signal, falls $x[k] = -x[-k] \forall k \in \mathbb{Z}$ gilt.

15

$$x[-k] = \begin{cases} \frac{1}{-k}, k \neq 0 \\ 0, k = 0 \end{cases} = \begin{cases} -\frac{1}{k}, k \neq 0 \\ 0, k = 0 \end{cases} = -x[k]$$

16

$$y[-k] = \begin{cases} \frac{1}{(-k)^2}, k \neq 0 \\ 0, k = 0 \end{cases} = \begin{cases} -\frac{1}{k^2}, k \neq 0 \\ 0, k = 0 \end{cases} = y[k]$$

17

- $x[k]$ heißt kausales Signal, falls gilt: $x[k] = 0 \forall k < 0$
- $x[k]$ heißt nicht-kausales Signal, falls gilt $\exists k < 0 : x[k] \neq 0$
- $x[k]$ heißt anti-kausales Signal, falls $x[-k-1]$ kausal ist, d.h. falls gilt:
 $x[k] = 0 \forall k \leq 0$

18

- $x[k]$ ist nicht-kausal
- $u[k]$ ist kausal
- $v[k]$ ist anti-kausal

19

$$\delta[k] := \begin{cases} 1, k = 0 \\ 0, k \neq 0 \end{cases}$$

20

$$\epsilon[k] := \begin{cases} 1, k \geq 0 \\ 0, k < 0 \end{cases}$$

21

$$\delta[k - k_0] = \begin{cases} 1, k = k_0 \\ 0, k \neq k_0 \end{cases}$$

bzw.

$$\delta[k + k_0] = \begin{cases} 1, k \neq -k_0 \\ 0, k = -k_0 \end{cases}$$

22

$$\begin{aligned} x[k] \cdot \delta[k - i] &= \begin{cases} x[i], k = i \\ 0, k \neq i \end{cases} \\ &= x[i] \cdot \delta[k - i] \end{aligned} \quad (2.1)$$

Siebeigenschaft

23

$$x[k] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] \cdot \delta[k - i] \quad \text{für alle } k \in \mathbb{Z}$$

24

$$x[k] = \sum_{i=-K}^K x[i] \cdot \delta[k - i]$$

25

$$\begin{aligned} u[k] &= \delta[k + 2] + \delta[k + 1] + \delta[k] + \delta[k - 1] \\ v[k] &= 2 \cdot \delta[k + 3] + \delta[k + 1] - \delta[k - 1] - 2 \cdot \delta[k - 3] \end{aligned}$$

26

$$\text{sgn}[k] := \epsilon[k] - \epsilon[-k] = \begin{cases} 1, k > 0 \\ 0, k = 0 \\ -1, k < 0 \end{cases}$$

27

$$\text{III}[k] := \epsilon[k] + \epsilon[-k - 1] = 1 \text{ für alle } k \in \mathbb{Z}$$

28

$$\text{rect}_{k_1, k_2}[k] := \epsilon[k - k_1] - \epsilon[k - k_2 - 1] = \begin{cases} 1, k_1 \leq k \leq k_2 \end{cases}$$

29

$$x[k] = q^k \cdot \epsilon[k]$$

30

$$x[k] : 0, \dots, 0, x[0] = 1, x[1] = -0.7, x[2] = 0.49, x[3] = 0.343, \dots$$

31

$$x[k] : 0, \dots, 0, x[0] = 1, x[1] = -0.8, x[2] = 0.64, x[3] = -0.512, \dots$$

32

$$\begin{aligned} x[k] + y[k] &: x[-\infty] + y[-\infty], \dots, x[0] + y[0], x[1] + y[1], \dots, x[\infty] + y[\infty] \\ x[k] \cdot y[k] &: x[-\infty] \cdot y[-\infty], \dots, x[0] \cdot y[0], x[1] \cdot y[1], \dots, x[\infty] \cdot y[\infty] \\ c \cdot x[k] &: c \cdot x[-\infty], \dots, c \cdot x[0], c \cdot x[1], \dots, c \cdot x[\infty] \end{aligned}$$

33

$$S_{k_1, k_2} := \{ \vec{x} \in S \mid x[k] = 0 \forall k < k_1 \text{ oder } k > k_2 \}$$

34

$$\begin{aligned} \vec{x} &= (0 \quad 3 \quad 2 \quad 5 \quad 0 \quad 0) \\ \vec{y} &= (0 \quad 0 \quad 2 \quad -3 \quad 0 \quad 2) \\ \vec{x} + \vec{y} &= (0 \quad 3 \quad 4 \quad 2 \quad 0 \quad 2) \\ \vec{x} - \vec{y} &= (0 \quad 3 \quad 0 \quad 8 \quad 0 \quad -2) \\ \vec{x} \cdot \vec{y} &= (0 \quad 0 \quad 4 \quad -15 \quad 0 \quad 0) \\ c + \vec{x} &= (0 \quad 15 \quad 10 \quad 25 \quad 0 \quad 0) \end{aligned}$$

35

$$(x * y)[k] := \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] \cdot y[k - i]$$

36

$$\begin{array}{ccc} i=0 & i=0 & i=0 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ x[i] = (3 \quad 2 \quad 1), & y[i] = (1 \quad -1 \quad 2) \text{ bzw. } & z[0-i] = (2 \quad -1 \quad 1) \end{array}$$

37

	$x[i] =$	$3 \quad 2 \quad 1$	$\sum x[i]y[k-i] =$	$(x * y)[k]$
$k=0$	$y[k-i] =$	$2 \quad -1 \quad 1$	$3 \cdot 1$	$= 3$
$k=1$		$2 \quad -1 \quad 1$	$3 \cdot (-1) + 2 \cdot 1$	$= -1$
$k=2$		$2 \quad -1 \quad 1$	$3 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) + 1 \cdot 1$	$= 5$
$k=3$		$2 \quad -1 \quad 1$	$2 \cdot 2 + 1 \cdot (-1)$	$= 3$
$k=4$		$2 \quad -1 \quad 1$	$1 \cdot 2$	$= 2$

38

$$x[k] * y[k] = 3\delta[k] - \delta[k - 1] + 5\delta[k - 2] + 3\delta[k - 3] + 2\delta[k - 4]$$

39

$$\begin{aligned} i &= -43 \\ \downarrow \\ x[i] &= (-1 \quad 3 \quad -2) \text{ und} \\ i &= 19 \\ \downarrow \\ y[i] &= (1 \quad -2 \quad 4 \quad -1) \text{ bzw. } y[-i] = (-1 \quad 4 \quad -2 \quad 1) \end{aligned}$$

40

$i = -43$ (pfeil)									
k	$x[i]$								$(x * y)[k]$
-24	$y[k - i] =$	-1	4	-2	1				-1
-23			-1	4	-2	1			$2 + 3 = 5$
-22				-1	4	-2	1		$-4 - 6 - 2 = -12$
-21					-1	4	-2	1	$1 + 12 + 4 = 17$
-20						-1	4	-2	$-3 - 8 = -11$
-19							-1	4	$-2 + 1 = -1$

41

$$\begin{aligned} (x * y)[k] &= -\delta[k + 24] + 5\delta[k + 23] - 12\delta[k + 22] + 17\delta[k + 21] \\ &\quad - 11\delta[k + 20] + 2\delta[k + 19] \end{aligned}$$