

Receptura

II.félév

Varga Balázs Pharm.D., PhD

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Debreceni Egyetem

Etilmorfint tartalmazó cseppek

► etilmorfin



Ethylmorphini hydrochloridum

► cseppek



Folyékony.

Mi lehet még benne?



víz



Aqua purificata

Rp./

Ethylmorphini hydrochloridi

centigrammata triginta (g 0,30)

Aquae purificatae

ad grammata quindecim (ad g 15,00)

Misce fiat solutio.

Detur ad vitrum fuscum guttatorium.

Signetur: Naponta 3x 20 cseppet bevenni!

► *Antitussivum. Analgeticum.*

► *Javallat: Kínzó köhögés csillapítására.*



Cseppentő betétes kupak



Sötét üvegek

Etilmorfint tartalmazó fájdalomcsillapító porkeverék koffeinnel (diszpenzált formula)

► etilmorfin



Ethylmorphini hydrochloridum

► koffein



Coffeinum

► Fájdalomcsillapító



pl. paracetamol



Paracetamolum,

Aszpirin



Acidum acetylsalicylicum

Rp./

Ethylmorphini hydrochloridi

cgta duo (g 0,02)

Coffeini

cgta sex (g 0,06)

Paracetamoli

Acidi acetylsalicylici


ana gma semis (aa g 0,50)

Misce fiat pulvis.

Dentur tales doses No decem (X).


Dentur ad capsulas ceratas.

D.S.: Szükség esetén 1 port bevenni!



Viaszos kapszula
Capsula cerata

Etilmorfint tartalmazó fájdalomcsillapító porkeverék koffeinnel (dividált formula)




Rp./
Ethylmorphini hydrochloridi
cgta duo (g 0,02)
Coffeini
cgta sex (g 0,06)
Paracetamoli
Acidi acetylsalicylici
ana gma semis (aa g 0,50)
Misce fiat pulvis.
Dentur tales doses No decem (X).
Dentur ad capsulas ceratas.
D.S.: Szükség esetén 1 port bevenni!

Rp./
Ethylmorphini hydrochloridi
cgta viginti (g 0,20)
Coffeini
cgta sexaginta (g 0,60)
Paracetamoli
Acidi acetylsalicylici
ana grammata quinque (aa g 5,00)
Misce fiat pulvis.
Divide in doses aequales No decem (X).
Dentur ad capsulas ceratas.
D.S.: Szükség esetén 1 port bevenni!

Viaszos kapszula
Capsula cerata

Kodeint tartalmazó fájdalomcsillapító porkeverék koffeinnel (diszpenzált formula)



► kodein
↓

Codeinum hydrochloridum
dihydricum

► koffein
↓

Coffeinum

► Fájdalomcsillapító
↓

pl. Aszpirin
↓

Acidum acetylsalicylicum

Rp./

Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta duo (g 0,02)

Coffeini
cgta sex (g 0,06)

Acidi acetylsalicylici
gma semis (g 0,5)

Misce fiat pulvis.


Dentur tales doses No triginta (XXX).

Da ad capsulas ceratas.

D.S.: Naponta 2x1 port bevenni!

Viaszos kapszula
Capsula cerata

Kodeint tartalmazó fájdalomcsillapító porkeverék koffeinnel (dividált formula)



Rp./
Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta duo (g 0,02)
Coffeini
cgta sex (g 0,06)
Acidi acetylsalicylici
gma semis (g 0,5)
Misce fiat pulvis.
Dentur tales doses No triginta (XXX).
Da ad capsulas ceratas.
D.S.: Naponta 2x1 port bevenni!

Rp./
Codeini hydrochloridi dihydrici
cgta sexaginta (g 0,60)
Coffeini
gma unum et cgta octaginta (g 1,80)
Acidi acetylsalicylici
gta quindecim (g 15,00)
Misce fiat pulvis.
Divide in doses aequales No triginta (XXX).
Da ad capsulas ceratas.
D.S.: Naponta 2x1 port bevenni!

Viaszos kapszula
Capsula cerata

Kábító és nem-kábító fájdalomcsillapító rendelése kúpban (diszpenzált formula)

► Kábító fájdalomcsillapító



morfin



Morphini hydrochloridum

► Nem-kábító fájdalomcsillapító



pl. Aszpirin



Acidum acetylsalicylicum

► Mi kell még egy kúpba?



Vivőanyag



Vehiculum

Rp./

Morphini hydrochloridi

cgta duo (g 0,02)

Acidi acetylsalicylici

gma semis (g 0,50)


Vehiculi

quantum satis


Misce fiat suppositorium.

Dentur tales doses No triginta (XXX).

D.S.: Fájdalom esetén 1 kúpot a
végbélbe helyezni! Maximum napi 3
kúp!



Kasírozott alufólia
(dobozon belüli csomagolás)



Kúpdobozok

Kábító és nem-kábító fájdalomcsillapító rendelése kúpban (dividált formula)



Rp./

Morphini hydrochloridi

cgta duo (g 0,02)

Acidi acetylsalicylici

gma semis (g 0,50)

Vehiculi

quantum satis

Misce fiat suppositorium.

Dentur tales doses No triginta (XXX).

D.S.: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni! Maximum napi 3 kúp!

Rp./

Morphini hydrochloridi

cgta sexaginta (g 0,60)

Acidi acetylsalicylici

gta quindecim (g 15,00)


Vehiculi

quantum satis


Ut fiant suppositoria.

Divide in doses aequales No triginta (XXX).

D.S.: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni! Maximum napi 3 kúp!



Kasírozott alufólia
(dobozon belüli csomagolás)



Kúpdobozok

Migrén ellenes kúp (diszpenzált formula)

- ▶ Migrén ellenes specifikus rohamoldó



ergotamin



Ergotamini tartras

- ▶ NSAID+koffein



pl paracetamol



Paracetamolum, Coffeinum

- ▶ Mi kell még egy kúpba?



Vivőanyag



Vehiculum

Rp./

Ergotamini tartratis

mgma unum (g 0,001)

Coffeini

cgta sex (g 0,06)

Paracetamoli

gma semis (g 0,5)

Vehiculi

quantum satis

Misce fiat suppositorium.

Dentur tales doses No sex (VI).


Da ad scatulam.

Da sub signo veneni.

S: Roham kezdetekor 1 kúpot a végbélbe helyezni!



Kasírozott alufólia
(dobozon belüli csomagolás)



Kúpdobozok

Migrén ellenes kúp (dividált formula) ↩

Rp./

Ergotamini tartratis

mgma unum (g 0,001)

Coffeini

cgta sex (g 0,06)

Paracetamoli

gma semis (g 0,5)

Vehiculi

quantum satis

Misce fiat suppositorium.

Dentur tales doses No sex (VI).

Da ad scatulam.

Da sub signo veneni.

S: Roham kezdetekor ...

Rp./

Ergotamini tartratis

mgta sex (g 0,006)

Coffeini

cgta triginta sex (g 0,36)

Paracetamoli

gta tria (g 3,0)

Vehiculi

quantum satis

Ut fiant suppositoria.

Divide in doses aequales No sex (VI).


Da ad scatulam.

Da sub signo veneni.

S: Roham kezdetekor 1 kúpot a végbélbe helyezni!



Kasírozott alufólia
(dobozon belüli csomagolás)



Kúpdobozok

Anesztetikus hatású rázókeverék FoNo szerint

Rp./

Suspensionis anaestheticae

FoNo dosim unam (I)

D.S.: 2-3 óránként 5ml-t szájba bevenni és lenyelni!

Aranyér kezelésére alkalmas kúp FoNo szerint

Rp./

Suppositorii ad nodum

FoNo doses duas (II)

D.S.: Naponta 2x1 kúpot a végbélbe helyezni!

Vizes rázókeverék FoNo szerint

Rp./

Suspensionis zinci aquosae

FoNo doses tres (III)

D.S.: Külsőleg! Hűsítő hatású rázókeverék.

Balzsam rühesség kezelésére FoNo szerint

Rp./

Linimenti scabicidei

FoNo doses quattuor (IV)

D.S.: Külsőleg! Balzsam rühesség kezelésére

Alkoholos jódooldat rendelése FoNo szerint

Rp./

Solutionis iodi alcoholicae

FoNo dosim unam (I)

D.S.: Külsőleg! Fertőtlenítésre.

Antibakteriális hatású szemkenőcs FoNo szerint

Rp./

Oculenti neomycini

FoNo dosim unam (I)

D.S.: Külsőleg! Szemkenőcs.

Nyálkahártya vagy bőr soor- fertőzésére ecsetelő FoNo szerint

Rp./

Glycerini boraxati

FoNo doses duas (II)

D.S.: Külsőleg! Ecsetelésre.

Castellani oldat önmagában vagy rezorcin vagy fukszin nélkül FoNo szerint

Rp./

Solutionis Castellani (sine rezorcino/fuchsino)

FoNo doses quinque (V)

D.S.: Külsőleg! Ecsetelésre.

Felületes gombás fertőzésekre hintőpor FoNo szerint

Rp./

Sparsorii antimycotici

FoNo doses sex (IV)

D.S.: Külsőleg! Hintőpor.

Fagykenőcs FoNo szerint

Rp./

Unguenti camphorati ad pernionem

FoNo dosim unam (I)

D.S.: Külsőleg! Fagykenőcs.

Gyermekkenőcs pelenkázáshoz FoNo szerint

Rp./

Unguenti infanti

FoNo doses tres (III)

D.S.: Külsőleg! Gyermekkenőcs.

Nagyfokú fájdalom csillapítására kúp FoNo szerint

Rp./

Suppositorii analgetici

FoNo doses duas (II)

D.S.: Fájdalom esetén 1 kúpot a végbélbe helyezni!

Étvágyjavító tinktúra FoNo szerint

Rp./

Tincturae amarae

FoNo doses duas (II)

D.S.: Étkezés előtt fél órával 30 cseppet bevenni!

Külső hallójárat gyulladása esetén bórsavtartalmú antiszeptikum FoNo szerint

Rp./

Otoguttae boricae

FoNo doses tres (III)

D.S.: Külsőleg! Fülcsepp.

Kenőcs emlőbimbó és végbélragádok, valamint erózió és fekélyesedés esetén FoNo szerint

Rp./

Unguenti lidocaini ad rhagades

FoNo dosim unam (I)

D.S.: Külsőleg! Kenőcs.

Szélhajtó teakeverék FoNo szerint

Rp./

Speciei carminativae

FoNo doses duas (II)

D.S.: Szélhajtó teakeverék!

Diazepam tartalmú injekció

Rp./

Injectionum Seduxen

ampullas originales No. II (duas)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

Alprazolam tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Frontin

scatulas originales No. III (tres)

D.S.: Naponta 3x1 tablettát bevenni!

Fenobarbitál tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Sevenal

scatulam originalem No. I (unam)

D.S.: Lefekvés előtt 1 tablettát bevenni!

Haloperidol injekció

Rp./

Injectionum Halidor

ampullas originales No. II (duas)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

Atípusos antipszichotikum tartalmú tableta

Rp./

Tablettarum Zyprexa

scatulas originales No. II (duas)

D.S.: Naponta 3x1 tablettát bevenni.

Antidepresszáns tartalmú tabletta

Rp./

Tablettarum Citalopram

scatulas originales No. III (tres)

D.S.: Naponta 3x1 tablettát bevenni.

Morfin tartalmú injekció

Rp./

Injectionum Morphinum hydrochloricum TEVA 10mg/ml
oldatos injekció 10x1 ml

ampullas originales No. X (decem)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

statim

Orálisan adható, opioid fájdalomcsillapító tartalmú készítmény

Rp./

Tablettarum MST Continus 100mg retard filmtabletta 20x
tablettas originales No. XX (viginti)

D.S.: Fájdalom esetén 1 tablettát bevenni. Naponta
maximum 2 tabletta.

statim

Fentanyl tartalmú tapasz

Rp./

Emplastrorum DUROGESIC 100 µg/óra transzdermális
tapasz 5x

emplastra originalia No. V (quinque)

D.S.: Naponta 1 tapaszt felragasztani.

statim

Acetil-szalicilsav tartalmú tabletta

Rp./

Tablettarum Aspirin

scatulas originales No. II (duas)

D.S.: Naponta 3x1 tablettát bevenni.

Megjegyzés: nem receptköteles!

Paracetamol tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Rubophen

scatulas originales No. III (tres)

D.S.: Láz esetén 1 tablettát bevenni.

Megjegyzés: nem receptköteles

Metamizol tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Algopyrin

scatulam originalem No. I (unam)

D.S.: Láz és fájdalom esetén 1 tablettát bevenni.

Megjegyzés: nem receptköteles

Diclofenac tartalmú kenőcs

Rp./

Unguenti Voltaren

scatulam originalem No. I (unam)

D.S.: Külsőleg.

Megjegyzés: nem receptköteles

Penicillin tartalmú injekció

Rp./

Injectionum Retardillin

ampullas originales No. III (tres)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

Amoxicillin tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Augmentin

scatulam originalem No. I (unam)

D.S.: Naponta 3x1 tablettát bevenni.

2. vagy 3. generációs cefalosporin tartalmú injekció

Rp./

Injectionum Lendacin

ampullas originales No. II (duas)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

Pneumónia empírikus kezelésére alkalmas fluorokinolon tartalmú tabletta

Rp./

Tablettarum Ciprobay

scatulas originales No. V (quinque)

D.S.: Naponta 3x1 tablettát bevenni.

Metronidazol tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Klion

scatulas originales No. II (duas)

D.S.: Naponta 2x1 tablettát bevenni.

Metotrexát tartalmú injekció

Rp./

Injectionum Trexan

ampullas originales No. II (duas)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

Daganatkemoterápia okozta hányás csillapítására alkalmazható tabletta

Rp./

Tablettarum Emetron

scatulas originales No. II (duas)

D.S.: Hányinger esetén 1 tablettát bevenni.

Metil-prednisolon tartalmú injekció

Rp./

Injectionum Solu-Medrol

ampullas originales No. IV (quattuor)

D.S.: Suo nomine, az orvos kezéhez.

Levotiroxin tartalmú tablettá

Rp./

Tablettarum Letrox

scatulam originalem No. I (unam)

D.S.: Naponta 2x1 tablettát bevenni.

Orálisan adható antidiabetikum II. típusú diabetes mellitusban szenvedő beteg számára

Rp./

Tablettarum Gilemal

scatulas originales No. V (quinque)

D.S.: Naponta 2x1 tablettát bevenni.