

# Natürliche Transformationen, Äquivalenzen von Kategorien, darstellbare Funktoren und das Lemma von Yoneda

Luciano Melodia

25.10.2022

## Zusammenfassung

In diesem Skript behandeln wir die Definition von natürlichen Transformationen. Wir veranschaulichen natürliche Transformationen durch möglichst viele Beispiele, insbesondere solche, die für die Topologie von besonderem Interesse sind. Dann befassen wir uns mit der Frage, wann Kategorien als äquivalent angesehen werden können. Schließlich klären wir den Begriff der Darstellbarkeit für kovariante und kontravariante Funktoren.

Mit Hilfe dieser Begriffe wird es uns gelingen, das Lemma von Yoneda zu beweisen, das oft als das wichtigste mathematische Ergebnis innerhalb der Kategorientheorie angesehen wird. Es beschreibt die Menge der natürlichen Transformationen zwischen einem **Hom**-Funktork und einem beliebigen anderen Funktor.

## 1 Natürliche Transformationen

Im Folgenden seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  Kategorien, und  $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Funktoren. Um natürliche Transformationen definieren zu können, brauchen wir die folgenden Daten und Eigenschaften:

- Einen Morphismus  $\tau_X : F(X) \rightarrow G(X)$  für jedes Objekt  $X \in \mathcal{A}$ .
- Die Eigenschaft falls  $f : X \rightarrow Y$  ein Morphismus in  $\mathcal{A}$  ist, so gilt

$$(1) \quad G(f) \circ \tau_X = \tau_Y \circ F(f).$$

Dies führt uns zu folgender Definition.

**Definition 1.1** (Natürliche Transformationen). Eine **natürliche Transformation**  $\tau : F \Rightarrow G$  von einem Funktor  $F$  zu einem zweiten Funktor  $G$  ordnet jedem Objekt  $X \in \mathcal{A}$  einen Homomorphismus  $\tau_X : F(X) \rightarrow G(X)$  in  $\mathcal{B}$  zu, auch **Komponente von  $\tau$  bei  $X$**  genannt, so dass für jeden Morphismus  $f : X \rightarrow Y$  in  $\mathcal{A}$  das folgende Diagramm kommutiert:

$$(2) \quad \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \downarrow \tau_X & & \downarrow \tau_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y) \end{array}.$$

Als Formel lässt sich das Diagramm ausdrücken durch folgende Gleichung:  $\tau_Y \circ F(f) = G(f) \circ \tau_X$ . Für Funktoren  $F, G$  wird mit  $\text{Mor}_{\text{Fun}}(F, G)$  die **Menge der natürlichen Transformationen** von  $F$  nach  $G$  bezeichnet.

*Anmerkung.* Die natürliche Transformation  $\tau$  ist die Gesamtheit aller Morphismen  $\tau_X$ . In der Literatur findet sich diese Tatsache in der Notation  $\tau = (\tau_X)_{X \in \mathcal{A}}$  wieder, wobei jedes  $\tau_X$  eine Komponente von  $\tau$  ist. Man kann eine gewisse Analogie zu dem Aufbau von Folgen als Gesamtheit ihrer Terme  $s = (s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  sehen.

In anderen Worten ist eine natürliche Transformation eine Sammlung von Abbildungen von einem Diagramm in ein anderes. Das Besondere an diesen Abbildungen ist, dass sie kommutieren. Nehmen wir eine natürliche Transformation zwischen zwei Funktoren  $\tau : F \Rightarrow G$ , dann können wir durch folgendes Diagramm eine bessere Intuition für natürliche Transformationen gewinnen:

$$(3) \quad \begin{array}{ccccc} & & F & \xRightarrow{\tau} & G \\ & & & & \\ F(X) & \xrightarrow{\tau_X} & & & G(X) \\ \downarrow & \searrow & & & \downarrow \\ & F(Z) & \xrightarrow{\tau_Z} & & G(Z) \\ \swarrow & \uparrow & & & \swarrow \\ F(Y) & \xrightarrow{\tau_Y} & & & G(Y) \end{array}$$

Um das obige Diagramm in Gänze verstehen zu können, betrachten wir im Anschluss ein paar Sonderfälle und Beispiele für natürliche Transformationen.

- Beispiel 1.1.** 1. Die Funktoren  $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  seien beide konstante Funktoren, also wird jedes Objekt  $X$  in  $\mathcal{A}$  auf ein einziges Objekt  $F(X)$  in  $\mathcal{B}$  abgebildet und jeder Morphismus auf  $\text{Id}_{F(Y)}$ . Analog soll  $G$  ein Objekt und einen Morphismus auf ein festes  $F(Y)$  und  $\text{Id}_{F(Y)}$  in  $\mathcal{B}$  abbilden. Dann ist eine natürliche Transformation von  $F$  nach  $G$  gegeben durch  $\tau : F(X) \Rightarrow F(Y)$ .
2. Sei  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  konstant für ein Objekt  $X$  in  $\mathcal{A}$  und  $G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  ein beliebiger Funktor. Dann besteht die natürliche Transformation  $\tau : F \Rightarrow G$  aus Abbildungen  $\tau_X : F(X) \rightarrow G(X)$ , eine für jedes  $X \in \mathcal{A}$ , sodass  $\tau_Y = G(f) \circ \tau_X$ , falls  $f : X \rightarrow Y$  ein Morphismus in  $\mathcal{A}$  ist. Veranschaulichen kann man das durch folgendes kommutierende Diagramm,

$$(4) \quad \begin{array}{ccccc} & & F(X) & & \\ & \searrow & \downarrow \tau_V & \searrow \tau_W & \\ & & G(V) & \xrightarrow{\tau_Y} & G(W) \\ & \swarrow \tau_X & \downarrow G(f) & \swarrow & \\ G(X) & \xrightarrow{\quad} & G(Y) & & \end{array}$$

wobei  $X, Y, V, W \in \mathcal{A}$  sind und die Knoten und Kanten des unteren Vierecks das durch  $G$  gegebene Diagramm meint. Die Gleichung  $\tau_Y = G(f) \circ \tau_X$ , die erfüllt werden muss, bringt jeweils die Dreiecke im Tetraeder zum kommutieren. In diesem Fall heißt  $\tau$  **Kegel über  $G$** .

3. Sei andererseits  $G$  konstant bei  $X \in \mathcal{A}$ , dann besteht eine natürliche Transformation aus einer Familie von Abbildungen  $\tau_X : F(X) \rightarrow G(Y)$ , sodass  $\tau_Y \circ F(f) = \tau_X$  gilt, genau dann wenn  $f : X \rightarrow Y$  ein Morphismus in  $\mathcal{A}$  ist. Veranschaulicht durch ein kommutierendes Diagramm,

$$(5) \quad \begin{array}{ccccc} & & F(V) & \xrightarrow{\quad} & F(W) \\ & \swarrow & \downarrow F(f) & \swarrow & \\ F(X) & \xrightarrow{\quad} & F(Y) & & \\ \downarrow \tau_X & \downarrow \tau_Y & \downarrow \tau_V & \downarrow \tau_W & \\ & & G(X) & & \end{array}$$

müssen die Seiten des Diagramms kommutieren. Dieses Diagramm heißt **Kegel unter  $F$** , oder manchmal auch **Kokegel**.

4. Seien  $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  Funktoren und  $f : X \rightarrow Y$  ein Morphismus in  $\mathcal{A}$ . Falls jede Komponente  $\tau_X : F(X) \rightarrow G(X)$  von  $\tau$  ein Isomorphismus ist, dann ist die Bedingung  $\tau_Y \circ F(f) = G(f) \circ \tau_X$  äquivalent zu  $F(f) = \tau_Y^{-1} \circ G(f) \circ \tau_X$ , da  $\tau_Y$  invertierbar ist. In einer Kategorie ist der Isomorphismusbegriff so definiert, dass für einen Morphismus  $f : X \rightarrow Y$  und  $g : Y \rightarrow X$  gilt  $g \circ f = \text{Id}_X$  und  $f \circ g = \text{Id}_Y$ , genau dann wenn  $X$  und  $Y$  isomorph sind. In einem kommutierenden Diagramm lässt sich das wie folgt darstellen:

$$(6) \quad \tau_Y \circ F(f) = G(f) \circ \tau_X, \quad F(f) = \tau_Y^{-1} \circ G(f) \circ \tau_X,$$

$$(7) \quad \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \downarrow \tau_X & & \downarrow \tau_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y), \end{array} \quad \begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \tau_X^{-1} \uparrow & & \tau_Y^{-1} \uparrow \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Wenn also jedes  $\tau_X$  ein Isomorphismus ist, ist die Natürlichkeitsbedingung vergleichbar mit der Konjugation. Sie erinnert auch an eine Homotopie von  $G$  nach  $F$ . Beide Sichtweisen legen nahe, dass, wenn jedes  $\tau_X$  ein Isomorphismus ist,  $F$  und  $G$  bis auf Umbenennung ihrer Elemente wirklich derselbe Funktor sind. Wenn dies der Fall ist, wird die natürliche Transformation  $\tau$  als **natürlicher Isomorphismus** bezeichnet, und  $F$  und  $G$  werden als **natürlich isomorph** bezeichnet.

## 1.1 Die Kategorie $\mathbf{BG}$ der Gruppen

Wir betrachten eine Gruppe  $G$ .

**Proposition 1.1.** *Dann ist  $\mathbf{BG}$  mit einem Objekt  $G$  und einem Morphismus  $g : G \rightarrow G$  für jedes Element  $g \in G$  eine Kategorie.*

*Beweis.* Da eine Gruppe abgeschlossen ist unter der Komposition, gilt für zwei Morphismen  $g, h : G \rightarrow G$ , welche kompatibel zueinander sind, dass auch  $g \circ h : G \rightarrow G$  ein Morphismus ist, nämlich das Gruppenelement  $gh \in G$ . Kompatibilität meint, dass das Bild von  $h$  gleich dem Urbild von  $g$  ist,  $\text{Im}(h) = g^{-1}$ . Die Identität  $e \in G$  fungiert als Identitätsmorphismus für  $G$  und die Assoziativität gilt aufgrund dessen, da Gruppenoperationen bereits assoziativ sind.  $\square$

Nun können wir einen Funktor  $F : \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$  in die Kategorie der Mengen definieren, der jedes Objekt  $G \in \mathbf{BG}$  auf genau eine Menge  $M \in \mathbf{Set}$  abbildet, und jedes Gruppenelement  $g \in G$  auf eine Funktion  $g \cdot - : M \rightarrow M, m \mapsto g \cdot m$  abbildet.

**Proposition 1.2.** *Die Funktorialität determiniert für jeden Funktor eine linke Gruppenoperation und das Bild eines einzelnen Objekts unter diesem Funktor ist eine  $G$ -Menge.*

*Beweis.* Seien  $C, D : \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$  Funktoren, sodass  $C(G) = M$  und  $D(G) = N$  für  $M, N \in \mathbf{Set}$  und sei  $g : G \rightarrow G$  ein Element der Gruppe. Dann ist  $\tau : C \Rightarrow D$  eine natürliche Transformation, bestehend aus genau einer Funktion  $\tau : M \rightarrow N$ , sodass  $\tau(g(m)) = g(\tau(m))$ , für jedes  $m \in M$ .  $\square$

Natürliche Transformationen sind also  **$G$ -äquivariante Abbildungen**. Diese Gleichung lässt sich mit dem nachfolgenden kommutierenden Diagramm noch einmal veranschaulichen.

$$(8) \quad \begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\tau} & N \\ \downarrow g \cdot - & & \downarrow g \cdot - \\ M & \xrightarrow{\tau} & N, \end{array} \quad \begin{array}{ccc} m & \longmapsto & \tau(m) \\ \downarrow & & \downarrow \\ gm & \longmapsto & \tau(g(m)) = g(\tau(m)). \end{array}$$

Ohne Zweifel ist man bereits über den Begriff des (Co)limes in der Kategorientheorie gestoßen. In den obigen Beispielen der Kegel und Kokegel werden bereits einige (Co)limites beschrieben. Beispiele wären die leere Menge, die Einpunktmenge, der Schnitt, die Vereinigung, das Produkt von Mengen, der Kern einer Gruppe, der Quotient von topologischen Räumen, die direkte Summe zweier Vektorräume, das freie Produkt von Gruppen oder der Pullback über ein Faserbündel. Jedes ist ein Spezialfall, welches eine Art universellen Kegel über einen bestimmten Funktor bildet.

## 1.2 Die Kategorie $\mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$ der $\mathbb{K}$ -Vektorräume

Wir betrachten nun ein typisches Beispiel für natürliche Transformationen, für das wir Beweisen wollen, dass es sich wirklich um eine natürliche Transformation handelt. Sei  $V$  dafür ein endlich dimensionaler Vektorraum über einem Körper  $\mathbb{K}$ , dann ist dieser isomorph zum Dualraum  $V^*$  sowie isomorph zum Doppeldualraum  $V^{**}$ . Beide sind Vektorräume über  $\mathbb{K}$ :

$$(9) \quad V^* = \{\text{lineare Abbildungen } V \rightarrow \mathbb{K}\},$$

$$(10) \quad V^{**} = \{\text{lineare Abbildungen } V^* \rightarrow \mathbb{K}\}.$$

Im ersten Fall gilt, falls  $\{v_1, \dots, v_n\}$  eine Basis von  $V$  ist, dass auch  $\{v_1^*, \dots, v_n^*\}$  eine Basis von  $V^*$  ist, wobei für jedes  $i \in \{1, \dots, n\}$  die Abbildung  $v_i^* : V \rightarrow \mathbb{K}$  gegeben ist durch

$$(11) \quad v_i^*(v_j) = \begin{cases} 1, & \text{if } i = j, \\ 0, & \text{if } i \neq j. \end{cases}$$

Wie bereits aus der linearen Algebra bekannt ist, handelt es sich bei  $V \rightarrow V^*$  nicht um einen kanonischen Isomorphismus. Unterschiedliche Basen erzeugen unterschiedliche Isomorphismen. Man kann sogar keinen Isomorphismus angeben, ohne sich vorher auf eine Basis festzulegen. Andererseits gibt es einen Isomorphismus von  $V \rightarrow V^{**}$ , der keine Wahl einer Basis benötigt: für jeden Vektor  $v \in V$  und ein Element  $f : V \rightarrow \mathbb{K}$ , also  $f \in V^*$ , sei  $\text{eval}_v(f) := f(v)$  die Evaluationsabbildung. Diese Abbildung wird in der Literatur häufig als **natürlicher Isomorphismus** bezeichnet. Was lässt sich für solche Isomorphismen also Schlussfolgern?

**Proposition 1.3.** *Die Gesamtheit aller Evaluationsabbildungen ist eine natürliche Transformation zwischen zwei Funktoren.*

*Beweis.* Um das zu sehen, sei  $(-)^{**} : \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \rightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$  der doppelte Dualfunctor, der jeden Vektorraum  $V$  auf seinen Doppeldualraum  $V^{**}$  abbildet und die linearen Abbildungen  $\phi : V \rightarrow W$  auf  $\phi^{**} : V^{**} \rightarrow W^{**}$ .  $\square$

Tbd.

## 2 Äquivalenzen von Kategorien

Äquivalente Kategorien sind identisch, mit Ausnahme der Tatsache, dass sie eine unterschiedliche Anzahl von isomorphen Kopien eines Objekts enthalten können. Wir werden diese Aussage in diesem Abschnitt präzisieren, indem wir definieren, wann zwei Kategorien als äquivalent gelten. Zu diesem Zweck seien  $\mathcal{A}, \mathcal{B}$  Kategorien. Man könnte die Äquivalenz von Kategorien wie folgt definieren:

**Definition 2.1** (Äquivalente Kategorien). Die Kategorien  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  heißen **äquivalent**, wenn es Funktoren  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  und  $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{A}$  gibt, so dass der Funktor  $F \circ G$  äquivalent ist zu  $\text{Id}_{\mathcal{B}}$  und der Funktor  $G \circ F$  äquivalent ist zu  $\text{Id}_{\mathcal{A}}$ .

Diese Definition ist jedoch nicht besonders nützlich. Es ist nicht sinnvoll, so etwas wie eine Inverse von Funktoren zu definieren, da sich die Suche nach einer solchen Inversen in der Regel als äußerst schwierig erweist. Die folgende Definition schafft daher Abhilfe:

**Definition 2.2** (Treue und volltreue Funktoren). Ein Funktor  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  wird als

1. **treu** bezeichnet, wenn für alle Objekte  $X, Y \in \mathcal{A}$  die durch  $F$  induzierte Abbildung  $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{B}}(F(X), F(Y))$  injektiv ist.
2. **volltreu** bezeichnet, wenn für alle Objekte  $X$  und  $Y$  in  $\mathcal{A}$  die durch  $F$  induzierte Abbildung  $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, Y) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{B}}(F(X), F(Y))$  eine Bijektion ist.

**Definition 2.3** (Äquivalenz von Kategorien). Ein Funktor  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  heißt **Äquivalenz von Kategorien**, wenn er volltreu und surjektiv auf Isomorphieklassen ist, also wenn es für jedes  $Y \in \mathcal{B}$  ein  $X \in \mathcal{A}$  mit  $F(X) \cong Y$  gibt. Die Kategorien  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  heißen **äquivalent**, wenn eine Äquivalenz  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  existiert.

**Beispiel 2.1.** Sei  $\mathcal{A}$  die Kategorie mit nur einem Objekt  $X$  und nur einem Morphismus  $\text{Id}_X : X \rightarrow X$ . Sei  $\mathcal{B}$  die Kategorie mit genau zwei Objekten  $\tilde{X}, \tilde{Y}$  und den Morphismen  $\text{Id}_{\tilde{X}} : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}, \text{Id}_{\tilde{Y}} : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{Y}, a : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$ , und  $b : \tilde{Y} \rightarrow \tilde{X}$  mit Verkettungen  $a \circ b = \text{Id}_{\tilde{Y}}$  und  $b \circ a = \text{Id}_{\tilde{X}}$ .

**Behauptung 2.1.** Die Kategorien  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  sind äquivalent.

*Beweis.* Sei  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$  sei ein solcher Funktor, dass  $F(\text{Id}_X) = \text{Id}_{\tilde{X}}$ .

1. Dann ist die durch  $F$  induzierte Abbildung  $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, X) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{B}}(F(X), F(X))$  injektiv, weil  $\text{Id}_{\tilde{X}} = b \circ a$ . Der Funktor  $F$  ist also treu.
2. Es gilt auch, dass die durch  $F$  induzierte Abbildung  $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, X) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{B}}(\tilde{X}, \tilde{X})$  surjektiv ist, denn

$$(12) \quad \text{Mor}_{\mathcal{B}}(\tilde{X}, \tilde{X}) := \{\text{Id}_{\tilde{X}}\},$$

ist eine Ein-Element-Menge. Also ist  $F$  volltreu.

3. Es bleibt zu zeigen, dass für jedes  $\tilde{X} \in \mathcal{B}$  ein  $X \in \mathcal{A}$  existiert, so dass  $F(X) \cong \tilde{X}$ . Also sei  $F(X) = \tilde{X}$ , dann gilt  $F(X) \cong \tilde{X}$  trivial. Da aber  $b \circ a = \text{Id}_{\tilde{X}}$  und  $a \circ b = \text{Id}_{\tilde{Y}}$ , gilt auch  $\tilde{X} \cong \tilde{Y}$ . Aufgrund der Tatsache, dass Isomorphie eine Äquivalenzrelation auf Klassen definiert, gilt auch  $F(X) \cong \tilde{Y}$ .

Dies zeigt, dass  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{B}$  äquivalent sind. □

### 3 Darstellbare Funktoren

Sei  $\mathcal{A}$  eine Kategorie und  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$  ein Funktor.

**Definition 3.1** (Darstellbare Funktoren). Der Funktor  $F$  heißt **darstellbar**, wenn es ein Objekt  $X$  in  $\mathcal{A}$  gibt und einen Isomorphismus  $F \cong \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$  von Funktoren.

Anders ausgedrückt soll der Funktor  $F : X \mapsto \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, M)$  abbilden, also  $F(X) = \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, M)$  in  $\mathbf{Set}$ . Man beachte, dass der Funktor  $F$  kontravariant ist. Man betrachte dafür nur den Morphismus  $f : X \rightarrow Y$ , dann ist der induzierte Morphismus  $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$  gegeben durch  $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(Y, M) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, M)$ . Die Fragen, die wir mit der Darstellbarkeit klären wollen, lassen sich also explizit wie folgt formulieren:

- Sei eine Kategorie  $\mathcal{A}$  gegeben. Was ist dann  $F$ ?
- Sei ein Funktor  $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{Set}$  gegeben, ist dann  $F \cong \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, M)$  für ein  $X \in \mathcal{A}$ ?

Sei  $f : X \rightarrow Y$  ein Morphismus. Für jedes  $M$  erhalten wir auf diese Weise eine Abbildung

$$(13) \quad (\cdot \circ f)^M : \text{Mor}_{\mathcal{A}}(Y, M) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, M),$$

$$(14) \quad g \mapsto g \circ f.$$

Das liefert uns eine natürliche Transformation  $(\cdot \circ f) : \text{Mor}_{\mathcal{A}}(Y, \cdot) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$ .

**Beispiel 3.1.** 1. Sei  $F : \mathbf{BG} \rightarrow \mathbf{Set}$  ein Funktor von der Kategorie der Gruppen in die Kategorie der Mengen. Damit wird eine Gruppe auf eine Menge abgebildet und der Gruppenhomomorphismus auf die zu Grunde liegende Funktion. Wir betrachten ein Element  $g \in G$ , dann gibt es einen eindeutigen Homomorphismus  $\phi_g : \mathbb{Z} \rightarrow G$ , so dass  $1 \mapsto g$ . Andererseits wird 1 immer auf ein Element von  $G$  abgebildet, also handelt es sich hierbei um eine Bijektion zwischen der Menge an Elementen in  $G$  und der Menge an Homomorphismen von  $\mathbb{Z}$  nach  $G$ . Diese Bijektion  $\tau_G : F(G) \rightarrow \text{Mor}_{\mathbf{BG}}(\mathbb{Z}, G)$  sind also die Komponenten des natürlichen Isomorphismus. Es bleibt zu zeigen, dass für jeden Gruppenhomomorphismus  $\varphi : G \rightarrow H$  für Gruppen  $G, H$  die Gleichung

$$(15) \quad \tau_H \circ F(\varphi) = \text{Mor}_{\mathbf{BG}}(\mathbb{Z}, \varphi) \circ \tau_G$$

erfüllt ist. Wir zeichnen zunächst ein kommutierendes Diagramm:

$$(16) \quad \begin{array}{ccc} F(G) & \xrightarrow{F(\varphi)} & F(H) \\ \downarrow \tau_G & & \downarrow \tau_H \\ \text{Mor}_{\mathbf{BG}}(\mathbb{Z}, G) & \xrightarrow{\text{Mor}_{\mathbf{BG}}(\mathbb{Z}, \varphi)} & \text{Mor}_{\mathbf{BG}}(\mathbb{Z}, H). \end{array}$$

Da  $F(\varphi)$  lediglich ein Gruppenhomomorphismus ist, sendet die linke Seite der Gleichung ein Element  $g \in G$  durch den eindeutigen Homomorphismus  $\phi_{\varphi(g)} : \mathbb{Z} \rightarrow H$ , so dass  $\phi_{\varphi(g)}(1) = \varphi(g)$ . Auf der rechten Seite bilden wir zunächst  $g$  auf den Homomorphismus  $\phi_g : \mathbb{Z} \rightarrow G$  ab und verknüpfen diesen dann mit  $\varphi$ . Dies erfüllt ebenfalls die Gleichung  $\varphi(\phi_g(1)) = \varphi(g)$  und damit  $\varphi \circ \phi_g = \phi_{\varphi(g)}$ . Also wird  $F$  durch  $\mathbb{Z}$  repräsentiert.

2. Tbd.

## 4 Yoneda Lemma

**Lemma 4.1** (Das Yoneda-Lemma). *Seien  $X$  und  $Y$  Objekte einer Kategorie  $\mathcal{A}$  und  $\tau : \text{Mor}_{\mathcal{A}}(Y, \cdot) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$  ein Isomorphismus von Funktoren von  $\mathcal{A}$  nach  $\mathbf{Set}$ . Dann gibt es genau einen Isomorphismus  $f : X \rightarrow Y$  mit  $\tau = (\cdot \circ f)$ . Insbesondere ist das Objekt  $X$  durch den Funktor  $\text{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \cdot)$  bestimmt bis auf eindeutige Isomorphie.*

*Beweis.*

□

## Literatur

- [1] Peter Fiebig (2020) *Einführung in die Darstellungstheorie. Vorlesungsskript*, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen.
- [2] Tai-Danae Bradley, Tyler Bryson, and John Terilla (2020) *Topology. A Categorical Approach*, MIT Press, Cambridge.
- [3] Tai-Danae Bradley (2017) *What is a Functor? Definition and Examples, Part I + II*, URL: <https://www.math3ma.com/blog/what-is-a-functor-part-1>, eingesehen am 17.20.2022.
- [4] Tai-Danae Bradley (2017) *What is a Natural Transformation? Definition and Examples, Part I + II*, URL: <https://www.math3ma.com/blog/what-is-a-natural-transformation-1>, eingesehen am 17.20.2022.