Homoclave	PR_D_012
Forma de la cabeza	larga
Color de ojos	Cafes
Forma de la cola	Gruesa
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50

DIAGNOSTICO	**neumonía por pasteurella**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque	Tulatromicina: 1 mL / 40 kg de peso vivo Florfenicol: 15-20 mg/kg de peso vivo	Tulatromicina: Dosis única Florfenicol / Enrofloxacina: Cada 24 horas por 3 a 5 días	Intramuscular profunda
Terapia Antiinflamatoria y Antipirética	Según el peso vivo del animal y la concentración comercial	Cada 24 horas por 2 días consecutivos	Intramuscular o subcutánea
Tratamiento Metafiláctico en Lote (Antibiótico en agua o alimento ante brotes en el corral)	Según la concentración del producto y el consumo del lote	Durante 5 a 7 días continuos en poblaciones expuestas	Vía oral (agua de bebida o alimento)