
Homoclave	PR_D_024
Forma de la cabeza	Corta
Color de ojos	Negros
Forma de la cola	Gruesa
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50



DIAGNOSTICO	**Sarna**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Tratamiento Inyectable (Ej. Ivermectina al 1% o Doramectina)	0.3 mL por cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 300 mcg/kg)	Dosis única, repitiendo una segunda aplicación a los 14 días para eliminar a las nuevas generaciones de ácaros que eclosionan de los huevos.	Subcutánea o intramuscular profunda
Tratamiento Tópico / "Pour-on" (Ej. Ivermectina tópica en solución para verter sobre el lomo)	Según el peso del animal (generalmente 1 mL por cada 10 kg de peso según etiqueta comercial)	Dosis única, repitiendo a los 14 días según el nivel de infestación de la granja.	Tópica (vertido directo sobre la línea dorsal del lomo)
Control Ambiental y Desinfección de Instalaciones	Aplicación de acaricidas autorizados para instalaciones (ej. cipermetrina o amitraz)	En cada vaciado de corrales o previo al ingreso de nuevos lotes	Aspersión / fumigación de pisos, paredes y estructuras