Homoclave	PR_D_032
Forma de la cabeza	larga
Color de ojos	Negros
Forma de la cola	Gruesa
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50

DIAGNOSTICO	**Rinitis atrofia infecciosa**	

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque / Control en Lote (Ej. Oxitetraciclina, Clortetraciclina, Trimetoprim-Sulfadiazina o Tilosina)	Según la concentración del producto comercial y el peso vivo	En el alimento o agua de bebida de las cerdas gestantes/lactantes y de los lechones en las primeras semanas postdestete durante 7 a 14 días consecutivos.	Intramuscular o vía oral en agua/alimento
Vacunación Preventiva	2.0 mL por animal (según la indicación del laboratorio fabricante)	Lechones: Aplicación a las pocas semanas de vida según recomendación del laboratorio.	Intramuscular profunda
Medidas de Manejo y Ambiental (Control de gases y ventilación)	Reducción de amoníaco y polvo en naves de maternidad y guardería	Monitoreo continuo del flujo de aire y densidad poblacional	Ambiental / Ventilación forzada o natural