Inomoclave	PR_D_036
Forma de la cabeza	corta
Color de ojos	negros
Forma de la cola	enrrollada
Pelaje	blanco
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (días)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50

DIAGNOSTICO	**destete y crecimiento**		
TRATAMIENTO	**DOSIS**	**FRECUENCIA**	**VIA DE ADMINISTRACION**
Antibioticoterapia Individual (Casos hiperagudos)	Según el peso vivo del animal y la concentración comercial	Cada 24 horas por 3 a 5 días	Intramuscular o subcutánea
Tratamiento Metafiláctico en Lote (Antibiótico en agua de bebida o alimento)	Según la concentración del producto y consumo del lote	Durante 5 a 7 días continuos en la etapa crítica postdestete	Vía oral (agua de bebida o alimento)
Terapia de Soporte y Manejo Nutricional	Según formulación comercial del alimento	comercial del alimento Restricción de alimento o cambio temporal a dietas de alta digestibilidad por 48-72 horas	Vía oral (en el comedero)

H10 I10 J10 K10 L10 M10 N10 O10 P10 Q10