Homoclave	PR_D_080
Forma de la cabeza	larga
Color de ojos	Cafes
Forma de la cola	Delgada
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50

DIAGNOSTICO	**Poliartritis infecciosa por mycoplasma**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia Específica	Lincomicina: 10-15 mg/kg de peso vivo. Tilosina: 10 mg/kg de peso vivo.	Cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos (la intervención temprana al inicio de la cojera es fundamental)	Intramuscular profunda
Terapia Antiinflamatoria y Analgésica	Según el peso vivo del animal y la concentración comercial	Cada 24 horas por 2 a 3 días consecutivos	Intramuscular o subcutánea
Tratamiento Metafiláctico en Lote (Antibiótico preventivo en agua o alimento ante brotes en la nave)	Según la concentración del principio activo (ej. Tilosina o Tiamulina)	Durante 7 a 10 días continuos en lotes expuestos	Vía oral (en el agua de bebida o mezclado en el alimento)