homoclave	PR_D_108
Forma de la cabeza	larga
Color de ojos	Negros
Forma de la cola	Enrrollada
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50



DIAGNOSTICO	**síndrome de desmedro y desgaste multisistermico posdestete**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
AVacunación Preventiva (PCV2)	1.0 mL a 2.0 mL por animal (según la marca comercial del laboratorio)	Dosis única en lechones al destete (o esquema de dos dosis según la recomendación del fabricante).	Intramuscular profunda
Antibioticoterapia de Soporte (Control de infecciones bacterianas secundarias respiratorias o entéricas)	Según el principio activo indicado por el médico veterinario (ej. Tulatromicina, Enrofloxacina o Amoxicilina)	Dosis única o repetir a los 3-5 días según la gravedad y el fármaco empleado	Intramuscular (casos individuales) o vía oral en agua/alimento (para lotes afectados)
Terapia Antiinflamatoria y de Soporte (Reducción de fiebre y malestar en fases agudas)	AINEs (ej. Meloxicam o Flunixin meglumina) según el peso vivo	Aplicación única o por 2 a 3 días consecutivos bajo supervisión veterinaria	Intramuscular o subcutánea