homoclave	PR_D_132
Forma de la cabeza	Corta
Color de ojos	Cafes
Forma de la cola	Delgada
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50

DIAGNOSTICO	**Glaesserella parasius**	

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque (Ej. Ceftiofur, Penicilina G procaínica / benzatínica o Enrofloxacina)	Ceftiofur: 3 a 5 mg/kg de peso vivo. Penicilina: 20,000 a 40,000 UI/kg de peso vivo.	Cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos (la intervención temprana es clave en casos hiperagudos).	Intramuscular profunda
Terapia Antiinflamatoria y Antipirética (AINEs para reducir fiebre, dolor articular e inflamación, ej. Meloxicam o Flunixin meglumina)	Según el peso vivo del animal y la concentración comercial	Cada 24 horas por 2 días consecutivos	Intramuscular o subcutánea
Vacunación Preventiva (Bacterinas comerciales frente a Glaesserella parasuis)	1.0 mL a 2.0 mL por animal (según la indicación del laboratorio fabricante)	Primovacunación en reproductoras (gestantes antes del parto para transferir anticuerpos vía calostro) y/o en lechones al destete	Intramuscular profunda