| | |
|---|---|
| **homoclave** | PR_D_156 |
| **Forma de la cabeza** | Mediana |
| **Color de ojos** | Negros |
| **Forma de la cola** | Delgada |
| **Pezuñas** | Inflamado |
| **Uniformidad del lote** | Baja |
| **Actividad animal** | Baja |
| **Apetito** | Malo |
| **Estado de la piel** | Sucia |
| **Temperatura corporal (°C)** | 38 |
| **Frecuencia respiratoria** | 25 |
| **Frecuencia cardiaca** | 70 |
| **C.agua consumida (L)** | 1 |
| **N. de lechones por camada** | 12 |
| **Edad al destete (dias)** | 21 |
| **Peso al destete (kg)** | 6 |
| **Longitud corporal (cm)** | 50 |



| **DIAGNOSTICO** | **Salmonelosis** | | |
|---|---|---|---|
| **TRATAMIENTO** | **DOSIS** | **FRECUENCIA** | **VIA DE ADMINISTRACION** |
| **Antibioticoterapia de Ataque** | Según el peso vivo del animal y la concentración del producto comercial (ej. Enrofloxacina 2.5–5 mg/kg) | Cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos | Intramuscular o subcutánea (casos graves individuales) / Vía oral en agua o alimento (para lotes afectados) |
| **Vacunación Preventiva (Vacunas vivas atenuadas o inactivadas contra Salmonella)** | 1.0 mL a 2.0 mL por animal (según la indicación del laboratorio fabricante) | Esquema preventivo en lechones al destete o reproductoras según el protocolo de la granja | Intramuscular profunda o vía oral (según presentación de la vacuna) |
| **Terapia de Soporte y Rehidratación (Electrolitos y vitaminas)** | Según la etiqueta del producto comercial seleccionado | Durante 3 a 5 días continuos en la fase aguda del brote | Vía oral (en el agua de bebida) |