Homoclave	PR_D_168
Forma de la cabeza	Mediana
Color de ojos	Cafes
Forma de la cola	Gruesa
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50



DIAGNOSTICO	**disentería**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque y Control (Ej. Tiamulina, Valnemulina, Lincomicina o Tilosina)	Tiamulina: 8.8 mg/kg de peso vivo (en agua) o 30-50 ppm (en alimento)	Tratamiento en agua o alimento durante 5 a 7 días continuos; los casos agudos graves se tratan vía inyectable por 3 días.	lVía oral (en el agua de bebida o alimento) o Intramuscular (casos individuales graves)
Tratamiento Metafiláctico de Lote (Antibiótico preventivo para el resto del corral o nave expuesta)	Según la concentración del principio activo y el consumo del lote (ej. Tiamulina o Lincomicina)	Durante 7 a 10 días continuos para cortar la cadena de transmisión en la población	Vía oral (en el agua de bebida o mezclado en el alimento)
Terapia de Soporte (Electrolitos y vitaminas para combatir la deshidratación y debilidad)	Según la etiqueta del producto comercial seleccionado	Durante 3 a 5 días continuos durante la fase crítica del cuadro diarreico	Vía oral (en el agua de bebida)