Homoclave	PR_D_180
Forma de la cabeza	Corta
Color de ojos	Negros
Forma de la cola	Delgada
Pezuñas	Inflamado
Uniformidad del lote	Baja
Actividad animal	Baja
Apetito	Malo
Estado de la piel	Sucia
Temperatura corporal (°C)	38
Frecuencia respiratoria	25
Frecuencia cardiaca	70
C.agua consumida (L)	1
N. de lechones por camada	12
Edad al destete (dias)	21
Peso al destete (kg)	6
Longitud corporal (cm)	50



DIAGNOSTICO	**ilietis porcina**	

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque / Control	Tilosina: 10 mg/kg de peso vivo (inyectable) o 40-100 ppm en alimento. Tiamulina: 8.8 mg/kg (agua) o 30-50 ppm (alimento).	Inyectable: Cada 24 horas por 3 a 5 días. Vía oral (agua/alimento): Durante 7 a 21 días continuos según el programa del lote.	Intramuscular o vía oral (en el agua de bebida o mezclada en el alimento)
Vacunación Preventiva (Vacuna viva atenuada contra Lawsonia intracellularis)	2.0 mL por animal (según la presentación comercial del laboratorio)	Dosis única aplicada vía oral o intramuscular (generalmente a partir de las 3 semanas de edad o al destete) en zonas endémicas.	Vía oral (en un pequeño volumen de agua o directamente en el hocico según indicaciones del fabricante) o intramuscular.
Terapia de Soporte (Vitaminas y electrolitos para animales con diarrea o deshidratación)	Según la etiqueta del producto comercial seleccionado	Durante 3 a 5 días continuos en la fase crítica del brote	Vía oral (en el agua de bebida)