Homoclave	PR_E_229
Color de pelaje	Rojizo
Peso Vivo (kg)	70
Apetito	Malo
Ganancia diaria de peso (g)	700
Marcha	Anormal
Temperatura rectal (°C)	38
Comportamiento	Alerta
Frecuencia respiratoria (rpm)	20
Consumo de alimento (kg)	1.5
Frecuencia Cardiaca (ipm)	60
Piel	Grave
Conversión alimenticia (kg)	2.6
Condicion Corporal	Mala
Respiracion	Mala
Postura	Erguida
Edad (semanas)	18



DIAGNOSTICO	**ESTREPTOCORIA PORCINA**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque: Penicilina G procaínica	Penicilina: 20,000 a 40,000 UI/kg de peso vivo.	Cada 24 horas durante 3 a 5 días consecutivos	Intramuscular profunda
Terapia Antiinflamatoria y de Soporte	Según el peso vivo del animal y la concentración comercial	Cada 24 horas por 2 días consecutivos	Intramuscular o subcutánea
Tratamiento Metafiláctico en Lote	Según la concentración del producto	Durante 5 a 7 días continuos en poblaciones de riesgo	Vía oral (agua de bebida o alimento)