Homoclave	PR_E_009
Color de pelaje	Negro
Peso Vivo (kg)	70
Apetito	Malo
Ganancia diaria de peso (g)	700
Marcha	Anormal
Temperatura rectal (°C)	38
Comportamiento	Alerta
Frecuencia respiratoria (rpm)	20
Consumo de alimento (kg)	1.5
Frecuencia Cardiaca (ipm)	60
Piel	Grave
Conversión alimenticia (kg)	2.6
Condicion Corporal	Mala
Respiracion	Mala
Postura	Erguida
Edad (semanas)	18

DIAGNOSTICO	**CIRCOVIROSIS PORCINA**	

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibiótico de soporte: Tulatromicina / Enrofloxacina	Según peso: 1 mL / 40 kg para tulatromicina	Dosis única o según criterio veterinario	Intramuscular o vía oral en agua/alimento
Antiinflamatorio (AINE): Meloxicam	Según peso: 0.4 mL / 10 kg	Cada 24 horas por 2 o 3 días	Intramuscular o subcutánea
Vitaminas y electrolitos	Según etiqueta del producto	3 a 5 días continuos	Vía oral : Agua de bebida