Homoclave	PR_E_143
Color de pelaje	Blanco
Peso Vivo (kg)	70
Apetito	Malo
Ganancia diaria de peso (g)	700
Marcha	Anormal
Temperatura rectal (°C)	38
Comportamiento	Alerta
Frecuencia respiratoria (rpm)	20
Consumo de alimento (kg)	1.5
Frecuencia Cardiaca (ipm)	60
Piel	Grave
Conversión alimenticia (kg)	2.6
Condicion Corporal	Mala
Respiracion	Mala
Postura	Erguida
Edad (semanas)	18



DIAGNOSTICO	**LEPTOSPIROSIS PORCINA**	

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Antibioticoterapia de Ataque: Oxitetraciclina	20 mg/kg de peso vivo	Dosis única (puede repetirse a los 7 días	Intramuscular profunda
Vacunación Preventiva (Bacterinas comerciales multiserovar)	2.0 mL a 5.0 mL por animal	Primovacunación (dos dosis separadas por 3-4 semanas)	Intramuscular
Control en Alimento / Lotes de Riesgo: Clortetraciclina o Doxiciclina	Según concentración del producto y peso del lote	Durante 1 a 2 semanas continuas en fases críticas de gestación o brotes en granja	Vía oral