| | |
|---|---|
| **Homoclave** | PR_E_173 |
| **Color de pelaje** | Rojizo |
| **Peso Vivo (kg)** | 70 |
| **Apetito** | Malo |
| **Ganancia diaria de peso (g)** | 700 |
| **Marcha** | Anormal |
| **Temperatura rectal (°C)** | 38 |
| **Comportamiento** | Alerta |
| **Frecuencia respiratoria (rpm)** | 20 |
| **Consumo de alimento (kg)** | 1.5 |
| **Frecuencia Cardiaca (ipm)** | 60 |
| **Piel** | Grave |
| **Conversión alimenticia (kg)** | 2.6 |
| **Condicion Corporal** | Mala |
| **Respiracion** | Mala |
| **Postura** | Erguida |
| **Edad (semanas)** | 18 |



| **DIAGNOSTICO** | **COLIBACILOSIS POR ESCHERICHIA COLI** | | |
|---|---|---|---|
| **TRATAMIENTO** | **DOSIS** | **FRECUENCIA** | **VIA DE ADMINISTRACION** |
| **Antibioticoterapia: Colistina, Gentamicina, Enrofloxacina o Neomicina** | Según el peso vivo del animal y la concentración del producto comercia | Cada 24 horas durante 3 a 5 días | Vía oral (jarabe o pasta para lactantes) o intramuscular (casos graves sistémicos) |
| **Terapia de Rehidratación y Electrolitos** | Según etiqueta del producto | Uso continuo durante el cuadro diarreico y recuperación | Vía oral (en agua de bebida o administrada directamente) |
| **Profilaxis / Vacunación en Cerdas** | 2.0 mL por cerda gestante | Dosis única o esquema de primovacunación + refuerzo 3-4 semanas antes del parto | Intramuscular profunda |