Homoclave	PR_E_190
Color de pelaje	Blanco
Peso Vivo (kg)	70
Apetito	Malo
Ganancia diaria de peso (g)	700
Marcha	Anormal
Temperatura rectal (°C)	38
Comportamiento	Alerta
Frecuencia respiratoria (rpm)	20
Consumo de alimento (kg)	1.5
Frecuencia Cardiaca (ipm)	60
Piel	Grave
Conversión alimenticia (kg)	2.6
Condicion Corporal	Mala
Respiracion	Mala
Postura	Erguida
Edad (semanas)	18



	PRRS		
TRATAMIENTO	**DOSIS**	**FRECUENCIA**	**VIA DE ADMINISTRACION**
Antibioticoterapia de Soporte	Según el peso del animal y la concentración del principio activo comercial	Dosis única o según el esquema terapéutico del fármaco empleado	Intramuscular (casos individuales) o vía oral en agua/alimento (para lotes afectados)
Vacunación Preventiva	1.0 mL a 2.0 mL por animal (según la indicación del laboratorio fabricante)	inmunización de lechones en destete	Intramuscular profunda
Terapia Antiinflamatoria / Antipirética	AINEs (ej. Meloxicam o Flunixin meglumina) según peso vivo	Cada 24 horas por 2 o 3 días consecutivos	Intramuscular o subcutánea