Homoclave	PR_S_013
Conformacion corporal	Largos
Forma de las patas	Paralelas
Calidad de las pezuñas	Simetricas, sin grietas
Temperamento	Agresivo
Calidad de la piel	Reseca
Desarrollo de las mamas	Pegados
Simetria de los testiculos en machos	Uniformes
Estado general de salud	Descargas nasales
Peso corporal (kg)	100
Longitud corporal (cm)	100
Altura de la cruz (cm)	65
Numero de pezones	12
Ganancia diaria de peso (g/dia)	650
Grosor de grasa dorsal (mm)	12
Numero de lechones por camada	10
Edad primer servicio (meses)	7



DIAGNOSTICO	**Síndrome de Vulvovaginitis y Prolapsos**		
TRATAMIENTO	**DOSIS**	**FRECUENCIA**	**VIA DE ADMINISTRACION**
Adición de secuestrantes o aglutinantes de micotoxinas al alimento	1.0 a 2.5 kg por tonelada de alimento	De forma continua en periodos de sospecha de grano contaminado	Vía oral
Reducción manual del prolapso y fijación con sutura en "bolsillo"	Limpieza con solución salina y aplicación de spray cicatrizante/antiséptico; sutura en bolsa de tabaco	Intervención única de emergencia en la cerda afectada	Tópica / Quirúrgica
Retirada del alimento contaminado y sustitución por fibra alta	Cambio de lote de grano e inclusión temporal de pulpa de remolacha o salvado de trigo al 5-10%	Durante 14 a 21 días hasta la remisión de los signos de hiperestrogenismo	Vía oral