Homoclave	PR_S_027
Conformacion corporal	Largos
Forma de las patas	Paralelas
Calidad de las pezuñas	Simetricas, sin grietas
Temperamento	Agresivo
Calidad de la piel	Reseca
Desarrollo de las mamas	Pegados
Simetria de los testiculos en machos	Uniformes
Estado general de salud	Descargas nasales
Peso corporal (kg)	100
Longitud corporal (cm)	100
Altura de la cruz (cm)	65
Numero de pezones	12
Ganancia diaria de peso (g/dia)	650
Grosor de grasa dorsal (mm)	12
Numero de lechones por camada	10
Edad primer servicio (meses)	7

DIAGNOSTICO	**Ilegítima Porcina**		
TRATAMIENTO	**DOSIS**	**FRECUENCIA**	**VIA DE ADMINISTRACION**
Tratamiento antibiótico de masa con Tilosina	100 mg por kg de alimento (ppm) o 40 mg/L en agua de bebida	Durante 7 a 21 días en periodos de riesgo de brote	Vía oral
Vacunación preventiva oral con vacuna viva modificada de Lawsonia	1 dosis por animal	Dosis única aplicada en la etapa de destete o pre-engorde	Vía oral
Tiamulina o Lincomicina	Tiamulina: 8-10 mg/kg de peso vivo.	Cada 24 horas durante 3 a 5 días en animales con melena	Intramuscular