Homoclave	PR_S_034
Conformacion corporal	Largos
Forma de las patas	Paralelas
Calidad de las pezuñas	Simetricas, sin grietas
Temperamento	Agresivo
Calidad de la piel	Reseca
Desarrollo de las mamas	Pegados
Simetria de los testiculos en machos	Uniformes
Estado general de salud	Descargas nasales
Peso corporal (kg)	100
Longitud corporal (cm)	100
Altura de la cruz (cm)	65
Numero de pezones	12
Ganancia diaria de peso (g/dia)	650
Grosor de grasa dorsal (mm)	12
Numero de lechones por camada	10
Edad primer servicio (meses)	7



DIAGNOSTICO	**Sarna Porcina**		

TRATAMIENTO	DOSIS	FRECUENCIA	VIA DE ADMINISTRACION
Tratamiento inyectable con Ivermectina o Doramectina	300 microgramos por kg de peso vivo (0.3 mg/kg)	Dos aplicaciones separadas por un intervalo de 14 días	Subcutánea profunda
Tratamiento masivo de control en el hato reproductor	1 mL por cada 33 kg de peso vivo (Ivermectina al 1%)	Aplicación sincronizada a todas las cerdas reproductoras 2 semanas antes del parto y a los verracos cada 6 meses	Subcutánea
Desinfección ambiental y control de fómites en instalaciones	Aplicación de acaricidas o piretroides de contacto en las superficies y corrales vacíos	Durante el vacío sanitario o lavado profundo de las parideras e instalaciones de transición	Aspersión ambiental / Tópica