

AUTOMATYKA I ROBOTYKA - SEMESTR 2

ANA2. ZESTAW 2. - Rozwiązania

Zad. 1. Wykazać zbieżność jednostajną szeregów funkcyjnych

$$(a) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx^2}}{1+n^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Korzystamy z kryterium Weierstrassa zbieżności jednostajnej: aby wykazać zbieżność jednostajną musimy oszacować $|f_n(x)|$ przez wyraz ogólny szeregu liczbowego zbieżnego

$$\left| \frac{e^{-nx^2}}{1+n^2} \right| \leq \frac{1}{1+n^2} \leq \frac{1}{n^2}$$

Szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ jest zbieżny $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx^2}}{1+n^2}$ jest jednostajnie zbieżny.

$$(b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{(n^2+x^2)^2}, \quad x \in (0, +\infty)$$

Tutaj również korzystamy z kryterium Weierstrassa:

$$\left| \frac{\ln(1+nx)}{(n^2+x^2)^2} \right| \leq \frac{nx}{(n^2+x^2)^2} \leq \frac{\frac{1}{2}(n^2+x^2)}{(n^2+x^2)^2} = \frac{1}{2(n^2+x^2)} \leq \frac{1}{2n^2}$$

Szereg liczbowy $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ jest zbieżny $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+nx)}{(n^2+x^2)^2}$ jest jednostajnie zbieżny.

Zad. 2. Zbadać dla jakich $x \in \mathbb{R}$ zbieżny jest szereg

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n(x^2+1)^n}$$

Zastosujemy tutaj kryterium Cauchy'ego dla szeregów liczbowych, potraktujemy szereg funkcyjny jako szereg liczbowy dla ustalonego x , granica, którą otrzymamy będzie zależała od x .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|x|}{\sqrt[n]{n(x^2+1)}} = \frac{2|x|}{x^2+1} < 1 \Rightarrow \text{szereg zbieżny}$$

$$\frac{2|x|}{x^2+1} < 1 \iff (|x| - 1)^2 > 0 \iff |x| \neq 1 \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

W związku z tym, że kryterium Cauchy'ego nie rozstrzyga zbieżności szeregu, gdy granica jest równa 1, czyli dla $x = \pm 1$, musimy jeszcze sprawdzić zbieżność szeregów w tych punktach.

$$x = 1 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{szereg harmoniczny} - \text{rozbieżny}$$

$$x = -1 : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot (-1)^n}{n \cdot 2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \text{szereg anharmoniczny} - \text{zbieżny}$$

Stąd obszar zbieżności $X = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Zad. 3. Wyznaczyć promień zbieżności i przedziały zbieżności szeregów potęgowych

$$(a) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} x^n$$

Skorzystamy z twierdzenia Cauchy - Hadamarda: $\lambda = \frac{1}{R}$, $0 < R < \infty$

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}(n+1)}{(n+1)2^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \cdot \frac{n+1}{n+2} = 2 \Rightarrow R = \frac{1}{2} \Rightarrow \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

Musimy jeszcze sprawdzić zbieżność szeregu na końcach przedziału:

$$x = -\frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} - \text{szereg anharmoniczny, zbieżny}$$

$$x = \frac{1}{2} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} - \text{szereg harmoniczny, rozbieżny}$$

Ostatecznie przedział zbieżności $X = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

$$(b) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} x^n$$

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln(n+1)}{(n+1) \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 \Rightarrow \\ \Rightarrow R = 1 \Rightarrow (-1, 1)$$

Granice ilorazu logarytmów najłatwiej wyznaczyć korzystając z tw. de l'Hospitala po wcześniejszym przejściu do dziedziny rzeczywistej:

$$x \geq 2 : \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x+1)}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x+1} = 1$$

Badamy zbieżność szeregu na końcach przedziału:

$$x = 1 : \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \text{ skorzystamy z kryterium całkowego zbieżności szeregu:}$$

Sprawdzamy założenia kryterium całkowego:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} > 0, \quad x \geq 2 \\ f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0, \quad x > e \Rightarrow f - \text{malejąca od pewnego miejsca}$$

$$\int_2^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_2^T \frac{\ln x}{x} dx = \lim_{T \rightarrow \infty} \left. \frac{1}{2} \ln^2 x \right|_2^T = \\ = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (\ln^2 T - \ln^2 2) = +\infty \Rightarrow \text{całka rozbieżna} \Rightarrow \text{szereg rozbieżny}$$

$$x = -1 : \quad \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n} \quad \text{pokażemy z kryterium Leibniza, że szereg jest zbieżny:}$$

$$\frac{\ln n}{n} > 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \text{ i ciąg monotonicznie dąży do } 0.$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad x \geq 2 : \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \\ f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0, \quad x > e \Rightarrow f - \text{malejąca od pewnego miejsca.}$$

Czyli przedział zbieżności $X = [-1, 1)$.

$$(c) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2n+1)}{6^n} x^{2n}$$

W tym przykładzie skorzystamy z kryterium d'Alemberta dla szeregów liczbowych, traktując szereg funkcyjny jako szereg liczbowy dla ustalonego x i otrzymując granicę zależną od x :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(2n+3)6^n x^{2n+2}}{n(2n+1)6^n x^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+3)}{6n(2n+1)} |x|^2 = \frac{|x|^2}{6} < 1$$

$$\frac{|x|^2}{6} < 1 \iff |x| < \sqrt{6} \Rightarrow (-\sqrt{6}, \sqrt{6})$$

Końce przedziału:

$x = \sqrt{6}$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2n+1)}{6^n} (\sqrt{6})^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n(2n+1) \Rightarrow$ szereg rozbieżny, bo nie jest spełniony warunek konieczny zbieżności szeregu liczbowego $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, czyli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

$x = -\sqrt{6}$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2n+1)}{6^n} (-\sqrt{6})^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n(2n+1) \Rightarrow$ szereg rozbieżny, bo nie jest spełniony warunek konieczny.

Przedział zbieżności: $X = (-\sqrt{6}, \sqrt{6})$.

$$(d) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{3^n + 2^n}$$

Przekształcimy najpierw wyraz ogólny szeregu:

$$\frac{(6-2x)^n}{3^n + 2^n} = \frac{2^n(3-x)^n}{3^n + 2^n} = \frac{(-1)^n 2^n}{3^n + 2^n} (x-3)^n, \quad a_n = \frac{(-1)^n 2^n}{3^n + 2^n}$$

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{3^n + 2^n}} = \frac{2}{3} \Rightarrow R = \frac{3}{2} \Rightarrow \Rightarrow \left(3 - \frac{3}{2}, 3 + \frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$$

λ obliczymy z tw. o 3 ciągach:

$$\frac{2}{3} \leftarrow \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{2}} = \sqrt[n]{\frac{2^n}{2 \cdot 3^n}} \leq \sqrt[n]{\frac{2^n}{3^n + 2^n}} \leq \sqrt[n]{\frac{2^n}{3^n}} = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{2}{3}$$

Końce przedziału:

$x = \frac{3}{2}$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{3^n + 2^n} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{3^n + 2^n}$ - szereg rozbieżny, bo nie jest spełniony warunek konieczny:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^n + 2^n} = 1 \neq 0$$

$x = \frac{9}{2}$: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{3^n + 2^n} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^n}{3^n + 2^n}$ - szereg rozbieżny, bo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ nie istnieje, nie jest spełniony warunek konieczny zbieżności szeregu liczbowego.

Stąd: $X = \left(\frac{3}{2}, \frac{9}{2}\right)$.

$$(e) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n 2^n \cdot \ln n}$$

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n 2^n \ln n}{(n+1) 2^{n+1} \ln(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\ln n}{\ln(n+1)} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = 2 \Rightarrow (-1, 3).$$

Końce przedziału:

$x = -1$: $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \ln n} \Rightarrow$ szereg zbieżny z kryterium Leibniza.

$x = 3$: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ skorzystamy z kryterium całkowego:

$f(x) = \frac{1}{x \ln x} > 0$, $x \geq 2$, $f'(x) = \frac{-(\ln x + 1)}{(x \ln x)^2} < 0 \Rightarrow$ - funkcja malejąca

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_2^T \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{T \rightarrow \infty} \ln |\ln |x|| \Big|_2^T = \lim_{T \rightarrow \infty} \ln |\ln |T| - \ln |\ln 2| = +\infty \Rightarrow \text{całka rozbieżna} \Rightarrow \text{szereg rozbieżny}$$

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \left\| y = \ln x \right\| = \int \frac{dy}{y} = \ln |\ln |x|| + C$$

Przedział zbieżności: $X = [-1, 3)$.

$$(f) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n+1} (x-1)^{n+2}$$

Zastosujemy kryterium d'Alemberta dla szeregów liczbowych:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{4^{n+1}(n+1)(x-1)^{n+3}}{4^n(n+2)(x-1)^{n+2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} 4 \cdot \frac{n+1}{n+2} \cdot |x-1| = 4|x-1| < 1$$

$$4|x-1| < 1 \iff |x-1| < \frac{1}{4} \Rightarrow \left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right).$$

Końce przedziału:

$$x = \frac{3}{4}: \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n+1} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^{n+2} = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{4^n}{n+1} \Rightarrow \text{szereg rozbieżny, bo}$$

warunek konieczny nie jest spełniony: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ nie istnieje.

$$x = \frac{5}{4}: \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^n}{n+1} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{n+2} = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} - \text{szereg harmoniczny, rozbieżny}$$

$$\Rightarrow X = \left(\frac{3}{4}, \frac{5}{4}\right).$$

Zad. 4. Znaleźć sumy szeregów potęgowych

$$(a) \quad x + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{x^{4n+1}}{4n+1} + \dots$$

$$\text{Szukamy sumy } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$$

Skorzystamy z tw. o całkowaniu i różniczkowaniu szeregu wyraz po wyrazie, musimy najpierw sprawdzić, czy promień zbieżności jest > 0 :

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[4n+1]{\frac{1}{4n+1}} = 1 \Rightarrow R > 0 \Rightarrow - \text{szereg jest zbieżny dla } x \in (-1, 1)$$

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n} = \frac{1}{1-x^4} \Rightarrow S(x) = \int \frac{dx}{1-x^4} = \int \frac{dx}{(1+x^2)(1-x)(1+x)} =$$

$$= -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x + C$$

$$S(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow S(x) = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x+1}{x-1} \right| + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x$$

$$(b) \quad \frac{x^2}{2} + \frac{x^6}{6} + \dots + \frac{x^{4n+2}}{4n+2} + \dots$$

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+2}}{4n+2} \quad \text{ i } \quad R > 0 \quad (\text{jak wyżej, } x \in (-1, 1))$$

Różniczkujemy szereg wyraz po wyrazie:

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{4n+1} = \frac{x}{1-x^4} \Rightarrow S(x) = \int \frac{x}{1-x^4} dx = \\ = -\frac{1}{4} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x+1} + \frac{1}{2} \int \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x^2+1}{x^2-1} \right| + C$$

$$S(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow S(x) = \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x^2+1}{x^2-1} \right|$$

$$(c) \quad \frac{x^2}{1 \cdot 2} - \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{(n-1) \cdot n} + \dots$$

$$S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{(n-1)n}, \quad R = 1 \quad (\text{jak wyżej, } x \in (-1, 1))$$

$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n-1}}{n-1}$$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$$

$$S'(x) = \int \frac{dx}{1+x} = \ln |1+x| + C, \quad S'(0) = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow S'(x) = \ln |1+x|$$

$$S(x) = \int \ln |1+x| dx = (x+1) \ln |x+1| - (x+1) + C$$

$$S(0) = 0 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow S(x) = (x+1) \ln |x+1| - x$$

Zad. 5. Obliczyć sumę szeregu liczbowego

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{3^n}$$

Można tę sumę obliczyć tak, jak w przykładzie z wykładu, różniczkując sumę szeregu potęgowego wyraz po wyrazie lub możemy całkować szukaną sumę wyraz po wyrazie:

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

Promień zbieżności $R > 0$, bo:

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)(n+3)}{(n+1)(n+2)} = 1 \Rightarrow R = 1$$

$$\int S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)x^{n+1} = S_1(x)$$

$$\int S_1(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \sum_{n=2}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x} = S_2(x)$$

Teraz aby otrzymać sumę $S(x)$ musimy zróżniczkować dwa razy otrzymaną funkcję:

$$S_1(x) = S_2'(x) = \frac{2x(1-x)+x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$$

$$S(x) = S_1'(x) = \frac{(2-2x)(1-x)^2 + 2(2x-x^2)(1-x)}{(1-x)^4} = \frac{2}{(1-x)^3}$$

Promień zbieżności szeregu po scałkowaniu lub zróżniczkowaniu wyraz po wyrazie pozostaje taki sam, więc w naszym przykładzie przedział zbieżności to $(-1, 1)$.

Wybieramy z tego przedziału $x = \frac{1}{3}$ i podstawiamy do otrzymanej sumy uzyskując sumę szeregu liczbowego:

$$x = \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{3^n} = S\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{\left(1-\frac{1}{3}\right)^3} = \frac{27}{4}$$