中位数为 X

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	512 megabytes

给定一个长度为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和一个整数 x。

定义序列的一个子序列为，从 $1, \ldots, n$ 中任选一个非空下标集合 $\{i_1, i_2, \cdots, i_m\}$ $(i_1 < i_2 < \cdots < i_m)$，把对应的 $a_{i_1}, \ldots, a_{i_m}$ 按原顺序取出来。定义它的中位数如下：

把这 m 个取出的数按数值从小到大排序，得到 $v_1 \le v_2 \le \cdots \le v_m$：

- 如果 m 是奇数，中位数就是排序后正中间的那个数 $v_{(m+1)/2}$；
- 如果 m 是偶数，中位数是排序后最中间两个数的平均值 $\frac{v_{m/2} + v_{m/2+1}}{2}$（注意这个平均值可能不是整数，但题目只关心它是否恰好等于 x）。

请你求出，给定序列有多少个子序列的中位数恰好等于 x。由于这个数可能非常大，你只需要输出它对 998244353 取模的结果。

注意：即使两个不同的下标集合对应完全相同的一组数值（因为原序列中可能存在相等的数），它们仍然被视为两个不同的子序列，各自独立计数；下标集合本身才是区分子序列的依据。空的下标集合不构成子序列，不参与计数。

Input

每个测试点包含多组测试用例。第一行包含测试用例的数量 t（$1 \le t \le 10^4$）。

对于每个测试用例：

- 第一行包含两个整数 n, x（$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$-10^9 \le x \le 10^9$），表示序列 a 的长度以及目标中位数。
- 第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（$-10^9 \le a_i \le 10^9$），表示给定序列。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 2×10^5。

Output

对每个测试用例，输出一行一个整数：中位数恰好等于 x 的子序列个数，对 998244353 取模。

Example

standard input	standard output
2 5 3 1 3 5 3 2 2 0 -1 1	14 1