D. 挑战图同构

【题目描述】

在研究图同构问题时，Pog 遇到了一些困难。众所周知，图同构是计算复杂性理论中的一个著名难题，其确切复杂性至今仍未被完全确定。于是，Pog 决定对图同构问题的定义进行修改。

首先，在一张带权无向图 G 中，定义路径 $u \to x_1 \to \cdots \to x_k \to v$ 的权值为该路径上所有边权的最大值。

接下来，定义图 G 上两个不同的点 u, v $(u \neq v)$ 之间的距离 $\mathrm{dis}_{\mathrm{G},u,v}$ $(u \neq v)$ 为所有 u 到 v 的路径的权值的最小值。若 u 和 v 不连通（即不存在 u 到 v 的路径），那么定义 $\mathrm{dis}_{\mathrm{G},u,v} = +\infty$。

定义两个具有 n 个顶点，编号为 $1, 2, \ldots, n$ 的图 G1, G2 同构，当且仅当对于所有的 u, v $(1 \leq u, v \leq n, u \neq v)$，有 $\mathrm{dis}_{\mathrm{G1},u,v} = \mathrm{dis}_{\mathrm{G2},u,v}$。请注意，这个定义与通常意义上的同构不同，不允许重新进行编号。

现在，请你帮助 Pog 判定在该新的定义下，给定的两张图是否同构。

【输入格式】

本题有多组数据，第一行一个整数 T $(1 \leq T \leq 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行三个整数 $n, m1, m2$ $(1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m1, m2 \leq 2 \times 10^5)$ 表示图的点数和 $G1, G2$ 的边数。

接下来 $m1$ 行，每行三个整数 u, v, w $(1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9)$ 表示 G_1 上的一条边。

接下来 $m2$ 行，每行三个整数 u, v, w $(1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9)$ 表示 G_2 上的一条边。

保证 T 组数据中 n 的和不超过 10^5，$m1$ 的和与 $m2$ 的和均不超过 2×10^5。注意，图中可能存在重边，自环，也可能不连通。

【输出格式】

对于每组数据：

输出一行一个字符串，若同构，输出 `YES`，否则输出 `NO`（不区分大小写）。

【样例 1 输入】

```
3
2 1 1
1 2 1
1 2 2
2 1 1
1 2 1
1 2 1
3 3 3
1 2 1
1 3 1
2 3 2
1 2 1
1 3 2
2 3 1
```

【样例 1 输出】

```
NO
YES
YES
```