Problem I. 吃饭

Grammy 有两位队友小 A 和小 B。平时，两位队友每天都会出去吃好吃的餐厅，而 Grammy 一般都吃学校食堂。因为学校食堂省时省钱，而出去吃饭有时候还要承担打车的费用。即使如此，有时 Grammy 也会选择和队友们一起出去改善伙食。

马上就要月底了，Grammy 的生活费也只剩下 m 元，她需要用这些钱度过接下来的 n 天。在第 i 天，她有两种选择：

- 在食堂吃饭，获得 a_i 的满意度，并花费 b_i 元。
- 和队友们出去吃，获得 c_i 的满意度，并花费 d_i 元。

由于小 A 和小 B 每天都出去吃，因此每天都会产生打车费用，其中第 i 天的打车费用为 e_i。三人为此制定了一个付打车费的规则：

- 若第 i 天 Grammy 没有出去吃，则本次打车费有 $\frac{p_i}{100}$ 的概率由小 A 支付，$(1-\frac{p_i}{100})$ 的概率由小 B 支付。
- 若第 i 天 Grammy 也出去吃了，且自 Grammy 上次支付打车费以来（若 Grammy 未支付过打车费，则从第一天算起），小 A 和小 B 都各自支付了至少一次打车费（无论当时 Grammy 是否出去吃），则本次打车费由 Grammy 支付。否则按上一条规则，由一位队友支付。

Grammy 将在每天吃饭前选择今天的行动。她每天都能知道前一天打车费的支付情况，且目标是最大化总满意度的期望值，同时在最差情况下的总开销不能超过 m 元。问：如果她每一天的决策都是最优的，总满意度的期望值是多少。

Input

每个测试文件仅有一组测试数据。

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n \le 2 \times 10^3$，$1 \le m \le 5 \times 10^3$），表示天数和总开销上限。

对于接下来的 n 行，第 i 行输入六个整数 a_i，b_i，c_i，d_i，e_i 和 p_i（$0 \le b_i, d_i, e_i \le 5 \times 10^3$，$0 \le a_i, c_i \le 10^9$，$0 \le p_i \le 100$）。它们的定义如上所述。

Output

输出一行一个数，表示总满意度的最大期望值。如果不存在一个在最坏情况下开销小于等于 m 元的方案，则输出 -1。

如果您的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则将被视为正确。更正式地，假设您的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，您的输出才会被接受。

Examples

standard input	standard output
2 10 6 4 15 8 10 50 5 2 13 5 8 50	20.000000000000
5 12 2 0 10 5 3 0 2 0 9 4 3 100 2 0 12 7 3 0 2 0 8 4 3 100 2 0 10 6 3 0	25.000000000000
6 20 1 2 3 10 1 69 5 1 12 2 2 23 0 4 2 3 5 41 6 1 6 9 0 84 1 1 14 9 5 98 3 2 13 2 4 43	35.771706880000
3 10 10 4 30 8 1 0 10 4 20 5 1 100 10 6 5 2 1 50	-1