

Vorlesung

Statistische Methoden der Datenanalyse

Prof. Dr. Dr. Wolfgang Rhode

Punktschätzung, Fitten und Regularisierung

Punktschätzung

Überblick

- Punktschätzung
- Minimierung
 - Methode der kleinsten Quadrate
 - Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate
 - Maximum-Likelihood-Methode
- Parameterschätzung mit Bayes Theorem
- Regularisierung

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Motivation

- Warum schätzen?
 - Genaue Messung möglicherweise zeitaufwendig und teuer
 - Messung vielleicht unmöglich
- Was brauchen wir zum Schätzen?
 - Stichprobe (kleine zufällige Auswahl der Messungen)
 - Schätzwert mit berechenbarer Unsicherheit
- Verschiedene Methoden
 - Punktschätzer (Konkreten unbekannten Parameter)
 - Intervallschätzer (Bereich für unbekannten Parameter)

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Motivation



→ Waage liefert Messwerte der Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$

Fragestellungen:

- Wie ist der Erwartungswert μ des Gewichts? (**Punktschätzung**)
- Wie ist die Standardabweichung σ des Gewichts bzw. die Genauigkeit der Waage? (**Punktschätzung**)
- In welchem Bereich liegt das Gewicht mit einer vorgegebenen Sicherheit? (**Intervallschätzung**)

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Punktschätzung

- Definition: Bestimmung eines **einzelnen** Wertes zur Schätzung eines unbekannten Parameters.
 θ : zu schätzender Parameter
 $\hat{\theta}$: Schätzwert des zu schätzenden Parameters

- Interessierender unbekannter Parameter ist oft ein Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Beobachtungen.
Beispiel: Erwartungswert μ der Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$
- Punktschätzungen ermöglichen keine Ableitungen von Genauigkeiten der Schätzung. Zur Berechnung von Genauigkeiten werden Intervallschätzungen benutzt (→ siehe Kapitel „Intervallschätzung“).

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Gebräuchliche Punktschätzer

- Modus: Häufigster Wert
- Median
- Arithmetisches Mittel
- Quadratisches Mittel
- Geometrisches Mittel
- Harmonisches Mittel

$$\bar{x}_{\text{med}} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})}, & n \text{ ungerade,} \\ \frac{1}{2} \left(x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)} \right), & n \text{ gerade.} \end{cases}$$

$$\bar{x}_{\text{arithm}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x}_{\text{quadr}} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

$$\bar{x}_{\text{geom}} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

$$\bar{x}_{\text{harm}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Berechnung von Punktschätzern

- Methoden:
 - Momenten-Schätzer
 - Maximum-Likelihood-Schätzer

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Berechnung von Punktschätzern

- Verschiedene Momenten-Schätzer für θ :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^3, \quad \dots$$

1. Moment 2. Moment 3. Moment

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Berechnung von Punktschätzern

- Beispiel Momenten-Schätzer:
Schätzen von Mittelwert und Varianz der Normalverteilung

X_i seien u.i.v. Zufallsvariablen mit $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$

Zu schätzen: $\theta = (\mu, \sigma^2)$

$$\tau_1(\theta) = \mu = E(X_1) \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum X_i$$

$$\tau_2(\theta) = \sigma^2 = \text{Var}(X_1) = E(X_1^2) - E(X_1)^2 \Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum X_i \right)^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X}_n)^2$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Berechnung von Punktschätzern

- Maximum-Likelihood-Schätzer für θ :

Likelihood:

$$L(\theta | x_1, \dots, x_n) = f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \prod f(x_i; \theta) = \prod L(\theta | x_i)$$

Log-Likelihood (oft einfacher zu berechnen):

$$l(\theta | x_1, \dots, x_n) = \log(L(\theta | x_1, \dots, x_n)) = \log(f(x_1, \dots, x_n; \theta)) = \sum \log(f(x_i; \theta)) = \sum l(\theta | x_i)$$

→ Aufgrund der Monotonie des Logarithmus' sind Maxima gleich

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Berechnung von Punktschätzern

- Beispiel Likelihood-Schätzer:
Schätzen von Mittelwert und Varianz der Normalverteilung

X_i seien u.i.v. Zufallsvariablen mit $X_1 \sim N(\mu, \sigma^2)$

Zu schätzen: $\theta = (\mu, \sigma^2)$

$$L(\mu, \sigma^2 | x_1, \dots, x_n) = \prod \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

$$\begin{aligned} L(\mu, \sigma^2 | x_1, \dots, x_n) &= \sum \left[\ln\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}\right) - \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] \\ &= \sum \left[-\ln\sqrt{2\pi} - 0.5\ln\sigma^2 - \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] \end{aligned}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Berechnung von Punktschätzern

- Beispiel Likelihood-Schätzer:
Schätzen von Mittelwert und Varianz der Normalverteilung

Maxima bestimmen:

$$\frac{\partial l(\mu, \sigma^2)}{\partial \mu} = \sum \frac{2(x_i - \mu)}{2\sigma^2} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{\partial l(\mu, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = \sum \left[-\frac{1}{2\sigma^2} + \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^4} \right] \stackrel{!}{=} 0$$

Berechnung von Punktschätzern

- Beispiel Likelihood-Schätzer:
Schätzen von Mittelwert und Varianz der Normalverteilung

Erhalte Gleichungssystem:

$$n\hat{\mu} = \sum x_i \Rightarrow \hat{\mu} = \bar{x}$$

$$n\hat{\sigma}^2 = \sum (x_i - \hat{\mu})^2$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

→ Gleiche Schätzer wie bei Momenten-Methode!

Kriterien zur Beurteilung der Schätzer

- Erwartungstreue:
(Erwartungswert von Schätzer = Schätzer)

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

- Verzerrung (Bias):

$$B(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$$

- Mean Squared Error (MSE):

$$MSE(\hat{\theta}) = E((\hat{\theta} - \theta)^2) = B(\hat{\theta})^2 + Var\hat{\theta}$$

Erwartungstreue

- Beispiel: Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$

$$E(\hat{\mu}) = E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \frac{1}{n} n\mu = \mu$$

→ Erwartungstreu bzw. unverzerrt!

Erwartungstreue

- Beispiel: Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$

$$\begin{aligned} E(\hat{\sigma}^2) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum (X_i - \mu + \mu - \bar{X})^2\right) \\ &= \frac{1}{n} E\left(\sum ((X_i - \mu)^2 - 2(X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + (\bar{X} - \mu)^2)\right) \\ &= \frac{1}{n} E\left(\sum (X_i - \mu)^2 - 2 \sum (X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + \sum (\bar{X} - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{n} E\left(\sum (X_i - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)(\bar{X} - \mu) + n(\bar{X} - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{n} E\left(\sum (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum E(X_i - \mu)^2 - nE(\bar{X} - \mu)^2\right) \\ &= \frac{1}{n} (Var(X_i) - nVar(\bar{X})) \\ &= \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

→ Verzerrt!

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Erwartungstreue

- Beispiel: Normalverteilung $N(\mu, \sigma^2)$

$$\begin{aligned} E(S^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = E\left(\frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) \\ &= \frac{n}{n-1} E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2 \end{aligned}$$

→ Unverzerrt!

→ Empirische Stichprobenvarianz S^2

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Wo begegnen wir noch Schätzern?

- Minimierung von Abstandsmaßen

Beispiel: Wir suchen Schätzer für \vec{a} in

$$f(x, \vec{a}) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \dots$$

→ Methode der kleinsten Quadrate

→ Log-Likelihood-Methode

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Fitten

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Methode der kleinsten Quadrate

- Allgemeiner Fall:
 - Daten beschrieben durch n-dim. Vektor $\vec{y}(\vec{x})$
 - Verschiedene Standardabweichungen σ
 - Korrelation beschrieben durch Kovarianzmatrix V
- Minimierung der Summe der Abstände zwischen Messung und Modell =
Minimierung der Summe der Abstände der Residuen Δy

$$S = \Delta \vec{y}^T V^{-1} \Delta \vec{y} \stackrel{!}{=} \min.$$

Methode der kleinsten Quadrate

- Häufige Anwendung:
 - Modell:

$$f(x, \vec{a})$$

- Messergebnisse sollen über Funktion f von Parametern a_j abhängen
 - Minimierung von S
 - Bestimmung der Parameter
 - Suche nach funktionellen Zusammenhängen
 - Test, ob Form der Parametrisierung verträglich mit Messdaten

Lineare Modelle

- $f(x, \vec{a})$ hängt linear von Parametern a_j ab

$$y(x) = f(x, \vec{a}) = a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \dots + a_p f_p(x)$$

- Residuen r_i :

$$r_i = y_i - f(x_i, \vec{a})$$

Lineare Modelle

- Erwartungswerte:

$$E[y_i] = f(x_i, \vec{a}) = \bar{y}_i$$

\vec{a} : wahrer Wert von \vec{a}

Für $\vec{a} = \vec{a}$ gilt:

$$E[\vec{r}] = 0$$

$$E[\vec{r}^2] = \text{Var}[\vec{r}] = \sigma^2$$

- Erwartungstreu
- Endliche Varianz
- Keine Annahme über Wahrscheinlichkeitsdichte notwendig

Lineare Modelle

- Minimiere:

$$S = \sum_i r_i^2 = \sum_i [y_i - a_1 f_1(x_i) - a_2 f_2(x_i) - \dots - a_p f_p(x_i)]^2$$

- Partielle Ableitungen nach a_j müssen dazu verschwinden:

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = 2 \sum_i f_1(x_i) [a_1 f_1(x_i) + a_2 f_2(x_i) + \dots + a_p f_p(x_i) - y_i] = 0$$

$$\frac{\partial S}{\partial a_2} = 2 \sum_i f_2(x_i) [a_1 f_1(x_i) + a_2 f_2(x_i) + \dots + a_p f_p(x_i) - y_i] = 0$$

\vdots

u.S.W.

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Lineare Modelle

- Umschreiben in Normalgleichungen:

$$a_1 \sum_i f_1^2(x_i) + \dots + a_p \sum_i f_1(x_i) f_p(x_i) = \sum_i y_i f_1(x_i)$$

$$a_1 \sum_i f_2(x_i) f_1(x_i) + \dots + a_p \sum_i f_2(x_i) f_p(x_i) = \sum_i y_i f_2(x_i)$$

\vdots

u.S.W.,

p Gleichungen

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Lineare Modelle

- Umschreiben in Matrixschreibweise

$$A = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \dots & f_p(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \dots & f_p(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_n) & f_2(x_n) & \dots & f_p(x_n) \end{pmatrix}$$

- A heißt auch **Design-Matrix**
- Vektor der Erwartungswerte: $A \cdot \vec{a}$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Lineare Modelle

- Minimierungsbedingung:

$$(A^T A) \vec{a} = A^T \vec{y}$$

- Es folgt folgender Schätzer:

$$\hat{\vec{a}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Lineare Modelle

- Und die Kovarianzmatrix?

- $\hat{\vec{a}}$ ist eine lineare Transformation von \vec{y}

$$\hat{\vec{a}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

→ Fehlerfortpflanzung analog zum vorherigen Kapitel

$$V[\hat{\vec{a}}] = (A^T A)^{-1} A^T V[\vec{y}] A (A^T A)^{-1}$$

Lineare Modelle

- Und die Kovarianzmatrix?

- Ohne Korrelation und gleichen Varianzen:

$$V[\vec{y}] = \sigma^2 \mathbb{1}$$

$$V[\hat{\vec{a}}] = \sigma^2 (A^T A)^{-1}$$

Lineare Modelle

- Quadratsumme der Residuen:

$$\hat{\vec{a}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

einsetzen in:

$$S = \vec{y}^T \vec{y} - 2 \hat{\vec{a}}^T A^T \vec{y} + \hat{\vec{a}}^T A^T A \hat{\vec{a}}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow \hat{S} &= \vec{y}^T \vec{y} - 2 \hat{\vec{a}}^T A^T \vec{y} + \hat{\vec{a}}^T A^T A (A^T A)^{-1} A^T \vec{y} \\ &= \vec{y}^T \vec{y} - \hat{\vec{a}}^T A^T \vec{y} \end{aligned}$$

Lineare Modelle

- Quadratsumme der Residuen:

- Summe der Residuen kann direkt berechnet werden
- Vorsicht: Differenz großer Zahlen
- Einzelbeiträge interessant: $E[\hat{S}] = \sigma^2(n - p)$

- Schätzung bei unbekannter Varianz: $\hat{\sigma}^2 = \frac{\hat{S}}{n - p}$

→ Gute Schätzung für große Werte

Gewichtete Methode der kleinsten Quadraten

Gegeben:

- Bekannte Wahrscheinlichkeitsdichte \hat{S}
- $\frac{\hat{S}}{\sigma^2}$ folgt χ^2 -Verteilung mit (n-p) Freiheitsgraden
- Gaußverteilte Messfehler

Gewichtete Methode der kleinsten Quadraten

Diagonale Kovarianzmatrix

- Datenpunkte mit unterschiedlichen Genauigkeiten
- Datenpunkte statistisch unabhängig (Kovarianz=0)

$$\Rightarrow V[\vec{y}] = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadraten

Diagonale Kovarianzmatrix

- Einführung der Gewichtungsmatrix:

$$W[\vec{y}] = V^{-1}[\vec{y}] = \begin{pmatrix} 1/\sigma_1^2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1/\sigma_2^2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1/\sigma_n^2 \end{pmatrix}$$

- Quadratsumme der Residuen:

$$\begin{aligned} S &= \vec{r}^T W \vec{r} \\ &= (\vec{y} - A\vec{a})^T W [\vec{y} - A\vec{a}] \end{aligned}$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadraten

Allgemeine Kovarianzmatrix

- Datenpunkte mit unterschiedlichen Genauigkeiten
- Datenpunkte korreliert untereinander
- Kovarianzmatrix nicht mehr diagonal, aber symmetrisch

Gewichtete Methode der kleinsten Quadraten

Allgemeine Kovarianzmatrix

- Lineare Algebra: Zu jeder symmetrischen Matrix gibt es orthogonale Matrix U, die die symmetrische Matrix in eine Diagonalmatrix transformiert

- Ansatz: $\vec{z} = U^T \vec{y}$

- Fehlerfortpflanzung: $V[\vec{z}] = U^T V[\vec{y}] U$

$$\Rightarrow S = (\vec{z} - U^T A \vec{a})^T \underbrace{W[\vec{z}]}_{\text{diagonal}} (\vec{z} - U^T A \vec{a})$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadraten

Allgemeine Kovarianzmatrix

- Vergleiche mit Gleichung von unkorrelierten Datenpunkten:

$$\begin{aligned} S &= (\vec{y} - A \vec{a})^T W[\vec{y}] (\vec{y} - A \vec{a}) \\ S &= (\vec{z} - U^T A \vec{a})^T \underbrace{W[\vec{z}]}_{\text{diagonal}} (\vec{z} - U^T A \vec{a}) \\ \Rightarrow U W[\vec{z}] U^T &= V^{-1}[\vec{z}] = W[\vec{y}] \end{aligned}$$

- Allgemeine Gleichung:

$$S = (\vec{y} - A \vec{a})^T W[\vec{y}] (\vec{y} - A \vec{a})$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate

- Allgemeine Lösung:

$$\begin{aligned} \hat{\vec{a}} &= (A^T W A)^{-1} A^T W \vec{y} \\ V[\hat{\vec{a}}] &= (A^T W A)^{-1} \end{aligned}$$

- Quadratsumme der Residuen:

$$\begin{aligned} \hat{S} &= \vec{y}^T W \vec{y} - \hat{\vec{a}}^T A^T W \vec{y} \\ E[\hat{S}] &= n - p \quad \text{„freie Parameter“} \end{aligned}$$

Beispiel: Geraden-Anpassung

$$y = f(x, a_1, a_2) = a_1 + a_2 x$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}$$

- Unkorrelierte Messwerte
→ Kovarianzmatrix und Gewichtungsmatrix diagonal

Beispiel: Geraden-Anpassung

$$A^T W A = \begin{pmatrix} \sum_i W_i & \sum_i W_i x_i \\ \sum_i W_i x_i & \sum_i W_i x_i^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_1 & S_x \\ S_x & S_{xx} \end{pmatrix}$$

$$A^T W \vec{y} = \begin{pmatrix} \sum_i W_i y_i \\ \sum_i W_i x_i y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_y \\ S_{xy} \end{pmatrix}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Geraden-Anpassung

$$(A^T W A)^{-1} = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} S_{xx} & -S_x \\ -S_x & S_1 \end{pmatrix}$$

$$D = S_1 S_{xx} - S_x^2$$

$$\hat{a} = (A^T W A)^{-1} A^T W y$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Geraden-Anpassung

$$\Rightarrow \begin{aligned} \hat{a}_1 &= (S_{xx} S_y - S_x S_{xy}) D \\ \hat{a}_2 &= (-S_x S_y + S_1 S_{xy}) D \end{aligned}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Geraden-Anpassung

- Kovarianzmatrix und Quadratsumme der Residuen

$$V[\hat{a}] = \frac{1}{D} \begin{pmatrix} S_{xx} & -S_x \\ -S_x & S_1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{S} = S_{yy} - \hat{a}_1 S_y - \hat{a}_2 S_{xy}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate

- Sonderfall: Fehler in beiden Variablen

$$y = a_1 + a_2 x$$

x_i mit σ_{x_i}

y_i mit σ_{y_i}

Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate

- Sonderfall: Fehler in beiden Variablen

- Minimiere:

$$S(a_1, a_2) = \sum_i \frac{(y_i - a_1 - a_2 x_i)^2}{\sigma_{y_i}^2 + a_2^2 \sigma_{x_i}^2}$$

- Gefordert:

$$\frac{\partial S}{\partial a_1} = 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial S}{\partial a_2} = 0$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate

- Sonderfall: Fehler in beiden Variablen

→ Anwendung von Optimierungsmethoden

→ Numerische Methoden wie z.B. Variation von a_2 und Berechnung von

$$\hat{a}_1 = \frac{\sum_i \frac{y_i}{\sigma_{y_i}^2 + a_2^2 \sigma_{x_i}^2} - \sum_i \frac{x_i}{\sigma_{y_i}^2 + a_2^2 \sigma_{x_i}^2}}{\sum_i \frac{1}{(\sigma_{y_i}^2 + a_2^2 \sigma_{x_i}^2)}}$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate

- Sonderfall: Lineare Regression

→ Minimierung der Quadratsumme der **senkrechten** Abstände zwischen Datenpunkten und Gerade

- Im Falle von gleichen Standardabweichungen:

$$S = \sum_i \frac{(y_i - a_1 - a_2 x_i)^2}{(1 + a_2^2) \sigma^2}$$

Gewichtete Methode der kleinsten Quadrate

- Sonderfall: Lineare Regression

$$\begin{aligned}\Rightarrow \hat{a}_1 &= \bar{y} - \hat{a}_2 \bar{x} \\ \hat{a}_2 &= q \pm \sqrt{q^2 + q} \\ \bar{y} &= \sum_i \frac{y_i}{n}, \quad \bar{x} = \sum_i \frac{x_i}{n} \\ q &= \frac{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 - \sum_i (x_i - \bar{x})^2}{2 \sum_i (y_i - \bar{y})(x_i - \bar{x})}\end{aligned}$$

- Vorzeichen testen!

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Methode der kleinsten Quadrate

- Nichtlineare Modelle:

- $f(x, \vec{a})$ hängt nicht linear ab von a_i
- Bsp.: $f(ax, \vec{a}) = a_1 \cdot \exp(a_2 x)$
- $\frac{\partial f}{\partial a_1}$ und $\frac{\partial f}{\partial a_2}$ hängen von den Parametern a_i ab

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Nichtlineare Modelle

- Linearisierung: Taylor-Entwicklung

$$f(x, \vec{a}) = f(x, \vec{a}^*) + \sum_{j=1}^p \underbrace{\frac{\partial f}{\partial a_j}(a_j - a_j^*)}_{\text{Ableitungen an der Stelle } a^*}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Nichtlineare Modelle

- Korrekturterm:

$$\Delta \vec{a} = \vec{a} - \vec{a}^*$$

- Residuen in linearer Näherung:

$$\vec{r} = \vec{y} - A \Delta \vec{a} - \vec{f}$$

- Jacobi-Matrix mit dem Näherungsvektor \vec{f} an der Stelle \vec{a}^* :

$$A = \begin{pmatrix} \partial f(x_1)/\partial a_1 & \partial f(x_1)/\partial a_2 & \cdots & \partial f(x_1)/\partial a_p \\ \partial f(x_2)/\partial a_1 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \partial f(x_n)/\partial a_1 & \cdots & \cdots & \partial f(x_n)/\partial a_p \end{pmatrix}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Nichtlineare Modelle

- Quadratsumme Residuen:

$$\begin{aligned} S &= \vec{r}^T W \vec{r} \\ &= (\vec{y} - A\Delta\vec{a} - \vec{f})^T W (\vec{y} - A\Delta\vec{a} - \vec{f}) \end{aligned}$$

- Normalgleichung:

$$\begin{aligned} (A^T W A) \Delta\vec{a} &= A^T W (\vec{y} - \vec{f}) \\ \Delta\vec{a} &= (A^T W A)^{-1} A^T W (\vec{y} - \vec{f}) \end{aligned}$$

Nichtlineare Modelle

- Näherungsweise weiter gültig:

$$\begin{aligned} \hat{a} &= (A^T W A)^{-1} A^T W y \\ V[\hat{a}] &= (A^T W A)^{-1} \\ E[\hat{S}] &= n - p \end{aligned}$$

Nichtlineare Modelle

- Konvergenz

- Hoffnung:

$$S(\vec{a}^* + \Delta\vec{a}) < S(\vec{a}^*)$$

- Sicher:

$$S(\vec{a}^* + \lambda\Delta\vec{a}) < S(\vec{a}^*)$$

→ Suche mit Salami-Taktik nach geeignetem λ

Nichtlineare Modelle

- Konvergenzkriterium

- Betrachte

$$\begin{aligned} \Delta S &= \Delta\vec{a}^T W (\vec{y} - \vec{f}) \\ \text{für } \Delta S < 1 &\text{ Abweichung innerhalb } 1\sigma \end{aligned}$$

- Beende, wenn z.B.

$$\Delta S < 0,1$$

→ Statistische Fehler überwiegen dann

Maximum-Likelihood-Methode

- **Likelihood-Funktion:**

$$L(\vec{a}) = f(\vec{x}_1|\vec{a}) \cdot f(\vec{x}_2|\vec{a}) \cdots f(\vec{x}_n|\vec{a}) = \prod_{i=1}^n f(\vec{x}_i|\vec{a})$$

→ Maß für Wahrscheinlichkeit bei festem \vec{a} Datensatz $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n$ zu messen

→ Keine Wahrscheinlichkeitsdichte!

Maximum-Likelihood-Methode

- Maximum-Likelihood-Prinzip:

- Beste Schätzung von \vec{a} maximiert $L(\vec{a})$

- Normierung notwendig: $\int f(\vec{x}|\vec{a}) d\vec{x} = 1 \quad \forall \vec{a}$

→ Numerischer Aufwand

- Maximum durch Differenzieren:

$$\frac{dL(\vec{a})}{d\vec{a}} = 0 \quad \frac{\partial L(\vec{a})}{\partial a_i} = 0 \text{ für } i = 1 \dots k$$

Maximum-Likelihood-Methode

- **Log-Likelihood-Funktion:**

$$l(\vec{a}) = \ln(L(\vec{a})) = \sum_{i=1}^n \ln(f(\vec{x}_i|\vec{a}))$$

- Logarithmus ist monoton
→ Maximum von $l(\vec{a})$ und $L(\vec{a})$ an der gleichen Stelle

- Vereinfachung der Gleichung durch Logarithmen-Regeln
- Oft: Minimierung der negativen Likelihood: $F(\vec{a}) = -l(\vec{a})$
→ Viele Algorithmen zu Minimierungsproblemen existieren...

Maximum-Likelihood-Methode

- Eigenschaften:

+ konsistent
+ nicht immer erwartungstreu
+ beides für $n \rightarrow \infty$
+ effizient

- Großer Rechenaufwand
- a priori Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsdichte notwendig
- Überprüfung der Verträglichkeit zwischen Daten und Parameter
(bei mehreren Dimensionen in allen Teilintervallen!)

Beispiel: Zerfallsintervallverteilung eines Teilchens

- Modell:

$$f(x|a) = \underbrace{\frac{1}{2}(1+ax)}_{\text{zufällig normiert! s.u.}} \quad \text{mit } x = \cos \vartheta$$

Beispiel: Zerfallsintervallverteilung eines Teilchens

- Normierung:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1+ax) dx &= \left. \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}ax^2 \right|_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{2}1 + \frac{1}{2}1 + \frac{1}{4}a - \frac{1}{4}a = 1 \end{aligned}$$

Beispiel: Zerfallsintervallverteilung eines Teilchens

- n Werte für x_i gemessen
- \hat{a} gesucht
- $-1 \leq x \leq 1$

$$\Rightarrow F(a) = - \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{1}{2}(1+ax_i) \right)$$

Beispiel: Gauß-Verteilung

$$\begin{aligned} f(x_i|a) &= \frac{1}{\sqrt{a\pi\sigma_i}} e^{-\frac{(x_i-a)^2}{a\sigma_i^2}} \\ \Rightarrow F(a) &= \text{konst} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i-a)^2}{\sigma_i^2} \end{aligned}$$

Beispiel: Gauß-Verteilung

$$\frac{dF(a)}{da} \stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow \quad - \sum_{i=1}^n \frac{x_i - a}{\sigma_i^2} = 0$$

$$\hat{a} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i w_i}{\sum_{i=1}^n w_i} \quad (\text{mit } w_i = 1/\sigma_i^2)$$

→ gewichtetes Mittel aller x_i

→ Gleiches Ergebnis wie bei Methode der kleinsten Quadrate

Fehlerbestimmung bei Maximum-Likelihood-Methode

- **Mehrere** Parameter

- Entwicklung der negativen Likelihood:

$$F(\vec{a}) = F(\hat{\vec{a}}) + \frac{1}{2} \sum_{i,k} \frac{\partial^2 F}{\partial a_i \partial a_k} (a_i - \hat{a}_i)(a_k - \hat{a}_k) + \dots$$

$$= F(\hat{\vec{a}}) + \frac{1}{2} \sum_{i,k} G_{ik} (a_i - \hat{a}_i)(a_k - \hat{a}_k) + \dots$$

$$G_{ik} = \frac{\partial^2 F}{\partial a_i \partial a_k} \quad V = G^{-1} = \text{Kovarianzmatrix}$$

Fehlerbestimmung bei Maximum-Likelihood-Methode

- **Ein** Parameter

- Betrachte Zeichnung $F(a)$ gegen a
- Schnittpunkte mit folgender Geraden markieren den 1σ -Bereich:

$$F = F_{min} + \frac{1}{2}$$

Fehlerbestimmung bei Maximum-Likelihood-Methode

- **Zwei** Parameter

- Konturlinien als Linien gleicher Likelihood

$$F(\vec{a}) = F(\hat{\vec{a}} + \frac{1}{2} r^2) \leftrightarrow F(\hat{\vec{a}}) + \frac{1}{2}$$

- Abweichung vom asymptotischen Verhalten
→ asymmetrische Fehler

Maximum-Likelihood-Methode

- Eigenschaften: Konsistenz und Erwartungstreue
 - Konsistenz: Es kann gezeigt werden (siehe Blobel), dass

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{a} = a_0$$

- Erwartungstreu bei symmetrischer Likelihood im Intervall $[-p\sigma, p\sigma]$
- Asymptotisch erwartungstreu bei asymmetrischer Likelihood

Maximum-Likelihood-Methode

- Eigenschaften: Varianz

$$\sigma(\hat{a}) = \left(\frac{d^2 F}{da^2} \bigg|_{\hat{a}} \right)^{-1/2}$$

→ kleinstmögliche Varianz

→ asymptotisch effizient

Parameterschätzung mit Bayes Theorem

Bayes Theorem

$$p(H_i|D, I) = \frac{p(H_i|I)p(D|H_i, I)}{p(D|I)}$$

- H_i Hypothese
- I Prior
- D Daten

Bayes Theorem

$$p(H_i|D, I) = \frac{p(H_i|I)p(D|H_i, I)}{p(D|I)}$$

- $p(D|H_i, I)$ Wahrscheinlichkeit die Daten D zu messen, wenn H_i und I wahr sind (auch Likelihood-Funktion $\mathcal{L}(H_i|D)$)
- $p(H_i|I)$ Prior p.d.f. der Hypothese H_i (Information vor der Beobachtung)
- $p(H_i|D, I)$ Posterior p.d.f. der Hypothese H_i
- $p(D|I) = \sum_i p(H_i|I)p(D|H_i, I)$ Normierung des Posteriors
- Im kontinuierlichen Fall gehen alle Summen in Integrale über

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Ein Beispiel – Messung der Neutrinomasse


- Messung der Neutrinomasse über den Zerfall von Neutronen
- Da die Neutrinomasse sehr klein ist, wäre es nicht allzu verwunderlich wenn ein Experiment einen negativen Wert messen würde
- Gauß Annahme für die Likelihood: $p(x|\mu, \sigma) = N(x|\mu, \sigma)$
- Prior p.d.f. wird durch eine Gleichverteilung für $m \geq 0$ beschrieben, da Massen nur positive Werte annehmen können

$$p(m) = \begin{cases} \text{const.}, & m \geq 0 \\ 0, & m < 0 \end{cases}$$
- Die Messung der Neutrinomasse liefert: $x_0 = -4 \text{ eV}$ mit einer bekannten Standardabweichung von $\sigma_0 = 2 \text{ eV}$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Bayesische Statistik

- Bayesische Wahrscheinlichkeitsdichte:
 - Messung des Zustandes unseres Wissens über den Wert eines Parameters
 - Der Parameter hat jedoch einen **FESTEN**, aber unbekannten Wert
- Bayesische Statistik kann als ein Lernprozess verstanden: Wenn neue Daten genommen werden, kann der alte Posterior als neuer Prior verwendet werden.

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Parameterschätzung

- Verwendung von Bayes Theorem, um aus Daten etwas über Werte von Parametern zu lernen
- Problem: Unter der Annahme eines Modells mit dem Parameter θ wird dessen p.d.f. gesucht
- Gegeben: Gemessene Daten x , sowie ein Prior $p(\theta)$

- Die Posterior p.d.f. lässt sich dann direkt berechnen:

$$p(\theta|x) = \frac{p(\theta)p(x|\theta)}{p(x)} = \frac{p(\theta)p(x|\theta)}{\int d\theta p(\theta)p(x|\theta)}$$

Regularisierung

Parameterschätzung

- Oft ist es nützlich die Posterior p.d.f. mit einer ausgewählten Parameterkonfiguration („best-fit“) und einer Konfidenzregion zusammenfassend zu beschreiben
- Für den „best-fit“ der p.d.f. bieten sich der Modus (wahrscheinlichster Wert) oder der Mittelwert der Verteilung an

$$\langle \theta \rangle = \int d\theta \theta p(\theta|x)$$

- Sind Modus und Mittelwert sehr unterschiedlich ist die p.d.f. sehr asymmetrisch und es sollte auf eine Zusammenfassung verzichtet werden
- Auf bayesische Konfidenzintervalle wird im Kapitel Testen eingegangen

Grundlage

- Korrekt gestellte Probleme** (nach J. Hadamard):
 - Existenz:** Problem hat eine Lösung
 - Eindeutigkeit:** Lösung ist eindeutig bestimmt
 - Stabilität:** Lösung hängt stetig von den Eingangsdaten ab
- Ansonsten: **inkorrekt/schlecht gestelltes Problem**
- Aufgrund endlicher Präzision beim Finden der Lösung und fehlerbehafteter Eingangsdaten kann ein korrekt gestelltes Problem unter Umständen instabil werden → **schlecht konditioniert**

Regularisierung

- Anwendungen:
 - Zur Lösung von schlecht gestellten Problemen
 - Zur Vermeidung von Überanpassung (overfitting)
- Regularisierung = Einbringen zusätzlicher Informationen
- Zusätzliche Informationen über Strafterme (Kostenterme) oder Einschränkungen des Parameterbereiches
- Verwendung oft im Bereich von Inversen Problemen (→ Kapitel „Entfaltung“) oder von maschinellem Lernen

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Tikhonov-Regularisierung

- Approximation einer positiv definiten (und somit invertierbaren) Matrix für die positiv semi-definite Matrix (auch Ridge-Regression genannt)
- Lineare Modelle: mittels L2-Norm
- Nicht lineare Modelle: mittels zweiter Ableitung
- Beispiel: Methode der kleinsten Quadrate mit Tikhonov-Regularisierung mittels der L2-Norm

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Lineare Modelle

- Minimierungsbedingung:

$$(A^T A) \vec{a} = A^T \vec{y}$$

- Es folgt folgender Schätzer:

$$\hat{\vec{a}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{y}$$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Lineare Modelle

- Minimierungsbedingung:

Problem: $(A^T A)$ kann singulär
oder
 $(A^T A)$ schlecht konditioniert
(annähernd singulär) sein

$$(A^T A) \vec{a} = A^T \vec{y}$$

- Es folgt folgender Schätzer:

$$\hat{\vec{a}} = \cancel{(A^T A)^{-1}} A^T \vec{y}$$

Inverse Matrix kann nicht berechnet werden

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Für die Lösung muss S minimiert werden
- S wird von:

$$S = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y})$$

zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + (\Gamma\vec{a})^\top (\Gamma\vec{a})$$

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Für die Lösung muss S minimiert werden
- S wird von:

$$S = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y})$$

zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + (\Gamma\vec{a})^\top (\Gamma\vec{a})$$

Regularisierung-
matrix

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Für die Lösung muss S minimiert werden
- S wird von:

$$S = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y})$$

zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + (\Gamma\vec{a})^\top (\Gamma\vec{a})$$

- Der regularisierte Schätzer wird zu:

$$\vec{a}^{\text{reg}} = (A^\top A + \Gamma^\top \Gamma)^{-1} A^\top \vec{y}$$

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Für die Lösung muss S minimiert werden
- S wird von:

$$S = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y})$$

zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + (\Gamma\vec{a})^\top (\Gamma\vec{a})$$

- Der regularisierte Schätzer wird zu:

$$\vec{a}^{\text{reg}} = (A^\top A + \Gamma^\top \Gamma)^{-1} A^\top \vec{y}$$

Auch invertierbar, wenn
(A[⊤]A) singular oder
schlecht konditioniert ist

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Die Art der Regularisierung hängt von der Wahl von Γ ab
- Häufig wird $\Gamma = \sqrt{\lambda} \underline{1}$ als ein Vielfaches der Einheitsmatrix gewählt
 - Der zu minimierende Ausdruck wird damit zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + \lambda \vec{a}^\top \vec{a}$$

- Der regularisierte Schätzer wird zu:

$$\vec{a}^{\text{reg}} = (A^\top A + \lambda \underline{1})^{-1} A^\top \vec{y}$$

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Die Art der Regularisierung hängt von der Wahl von Γ ab
- Häufig wird $\Gamma = \sqrt{\lambda} \underline{1}$ als ein Vielfaches der Einheitsmatrix gewählt
 - Der zu minimierende Ausdruck wird damit zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + \lambda \vec{a}^\top \vec{a}$$

L2-Norm

- Der regularisierte Schätzer wird zu:

$$\vec{a}^{\text{reg}} = (A^\top A + \lambda \underline{1})^{-1} A^\top \vec{y}$$

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Die Art der Regularisierung hängt von der Wahl von Γ ab
- Häufig wird $\Gamma = \sqrt{\lambda} \underline{1}$ als ein Vielfaches der Einheitsmatrix gewählt
 - Der zu minimierende Ausdruck wird damit zu:

$$S^{\text{reg}} = (A\vec{a} - \vec{y})^\top (A\vec{a} - \vec{y}) + \lambda \vec{a}^\top \vec{a}$$

- Der regularisierte Schätzer wird zu:

$$\vec{a}^{\text{reg}} = (A^\top A + \lambda \underline{1})^{-1} A^\top \vec{y}$$

Steuerung der
Regularisierungsstärke

Regularisierte Methode der kleinsten Quadrate

- Die Art der Regularisierung hängt von der Wahl von Γ ab


- Eine andere Möglichkeit ist: $\Gamma = \sqrt{\lambda} C A$ mit $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & -2 & 1 & \dots \\ \dots & & & & \\ \dots & & & 1 & -2 & 1 \\ \dots & & & & 1 & -1 \end{pmatrix}$

- Mit diesem Γ wird die numerischen zweite Ableitung der gefitteten Funktion für die Regularisierung genutzt

- Der regularisierte Schätzer wird zu:

$$\vec{a}^{\text{reg}} = \left(A^\top A + \lambda (C A)^\top (C A) \right)^{-1} A^\top \vec{y}$$

Beispiel:



$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$$

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
unregularisiert	0.1361	-0.1194	0.1233	-0.0476	0.0084	-0.0007


- Terme hoher Ordnung führen zu „Oszillationen“ der Lösung

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel:



$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$$

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
unregularisiert	0.1361	-0.1194	0.1233	-0.0476	0.0084	-0.0007
$\lambda = 0.1$	0.1277	-0.0908	0.0981	-0.0386	0.0069	-0.0006
$\lambda = 0.3$	0.1212	-0.0634	0.0715	-0.0285	0.0051	-0.0004
$\lambda = 0.7$	0.1172	-0.0406	0.0473	-0.0189	0.0034	-0.0003
$\lambda = 3.0$	0.1150	-0.0136	0.0164	-0.0065	0.0011	-0.0001
$\lambda = 10.0$	0.1156	-0.0045	0.0052	-0.0022	0.0004	-0.0000


- Die Regularisierung über die 2. Ableitung → Glättung des Ergebnisses
- Oszillationen der Lösung verschwinden

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel:



$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$$

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
unregularisiert	0.1361	-0.1194	0.1233	-0.0476	0.0084	-0.0007
$\lambda = 0.1$	0.1277	-0.0908	0.0981	-0.0386	0.0069	-0.0006
$\lambda = 0.3$	0.1212	-0.0634	0.0715	-0.0285	0.0051	-0.0004
$\lambda = 0.7$	0.1172	-0.0406	0.0473	-0.0189	0.0034	-0.0003
$\lambda = 3.0$	0.1150	-0.0136	0.0164	-0.0065	0.0011	-0.0001
$\lambda = 10.0$	0.1156	-0.0045	0.0052	-0.0022	0.0004	-0.0000

Mit stärkerer Regularisierung werden die Koeffizienten hoher Ordnung kleiner

- Die Regularisierung über die 2. Ableitung → Glättung des Ergebnisses
- Oszillationen der Lösung verschwinden

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Schätzen

Statistische Methoden
der Datenanalyse