

Vorlesung
Statistische Methoden der Datenanalyse
Prof. Dr. Dr. Wolfgang Rhode

Monte-Carlo Methoden

Überblick

- Erzeugung beliebig verteilter Zufallszahlen
 - Importance Sampling
- Markov-Chain-Monte-Carlo
- Monte-Carlo-Simulationen

RISE-Programm


- Auslandspraktikum
- Nur für Bachelorstudenten
- <https://www.daad.de/rise/de/rise-weltweit/praktikum-finden/>

Bisher gelernte Methoden zur Erzeugung von Zufallszahlen

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Inversion Sampling</i><ul style="list-style-type: none">+ Kein Verwerfen von Zufallszahlen+ Effizient- Integration der PDF- Invertierung der CDF- Nicht auf jede Verteilung anwendbar | <ul style="list-style-type: none">▪ <i>Rejection Sampling</i><ul style="list-style-type: none">+ Keine Integration oder Invertierung+ Auf jede Funktion anwendbar- Verwerfen von Zufallszahlen- Ineffizienter mit steigenden Dimensionen- Problem bei Verteilungen, die bis ins Unendliche reichen |
|--|--|

„curse of dimensionality“

Anzahl verworfener Zufallszahlen nimmt mit mehr Dimensionen zu



Importance Sampling

Gesuchte Verteilung: $f(x)$

1. Finden einer geeigneten Funktion $g(x)$ mit den Eigenschaften

- $g(x) \geq f(x) \forall x$
- $G(x) = \int_{-\infty}^x g(x') dx'$ ist invertierbar

2. Modifiziertes *rejection sampling*:

- Ziehung von zwei gleichverteilter Zufallszahlen $\xi_1, \xi_2 \in [0, 1]$
- Transformation von $\xi_1 \rightarrow \xi'_1$ entsprechend der Verteilung $g(x)$ mittels *inversion sampling*
- Annahme von ξ'_1 , falls $g(\xi'_1) \cdot \xi_2 \leq f(\xi'_1)$

➡ Der Bruchteil $\frac{g(x) - f(x)}{f(x)}$ der Zufallszahlen wird verworfen.


Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Importance Sampling (Beispiel)

Planck-Verteilung: $f(x) = N \frac{x^3}{e^x - 1}$

- Probleme:
- Exponentiell abfallend
- Verteilung geht bis Unendlich
- Beispiel: 82 von 100 Zufallszahlen werden verworfen

➡ Siehe Übung




Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden der Datenanalyse

Importance Sampling (Beispiel)

Majorantenfunktion: $g(x) = \begin{cases} f(x_{\max}) & x \leq x_1 \\ 200N x^{-0.1} \exp(-x^{0.9}) & x > x_1 \end{cases}$



Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden der Datenanalyse

Importance Sampling (Beispiel)


Vergleich: Erzeugen von 1 Mio. Zufallszahlen bei einem cutoff von 25

	zusätzliche Zufallszahlen	Laufzeit
Uniform	4.469.541	29.1 s
Importance	531.959	10.3 s

9 mal mehr zusätzliche Zufallszahlen,
aber nur 3 mal mehr Laufzeit:

- Gleichverteilung ist schneller zu erzeugen
- Abhängig vom cutoff:

Je mehr Zufallszahlen erzeugt werden sollen,
desto größer muss der cutoff gewählt werden
und desto ineffizienter wird das einfache rejection sampling



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Importance Sampling: Zusammenfassung

Vorteile:

- Sampeln bis Unendlich möglich
- Effizienter als einfaches rejection sampling
- Kein Dimensionalitätsproblem

Nachteile:

- Finden einer geeigneten Majorantenfunktion oftmals schwierig bis unmöglich
- Einfaches rejection sampling kann schneller sein, als kompliziertes importance sampling

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Markov Chain Monte Carlo



In putting together this issue of *Computing in Science & Engineering*, we knew three things: it would be difficult to list just 10 algorithms; it would be fun to assemble the authors and read their papers; and, whatever we came up with in the end, it would be controversial. We tried to assemble the 10 algorithms with the greatest influence on the development and practice of science and engineering in the 20th century. Following is our list (here, the list is in chronological order; however, the articles appear in no particular order):

- Metropolis Algorithm for Monte Carlo
- Simplex Method for Linear Programming
- Krylov Subspace Iteration Methods
- The Decompositional Approach to Matrix Computations
- The Fortran Optimizing Compiler
- QR Algorithm for Computing Eigenvalues
- Quicksort Algorithm for Sorting
- Fast Fourier Transform
- Integer Relation Detection
- Fast Multipole Method

hand in developing the algorithm, and in other cases, the author is a leading authority.

In this issue

Monte Carlo methods are powerful tools for evaluating the properties of complex, many-body systems, as well as nondeterministic processes. Isabel Beichl and Francis Sullivan describe the Metropolis Algorithm. We are often confronted with problems that have an enormous number of dimensions or a process that involves a path with many possible branch points, each of which is governed by some fundamental probability of occurrence. The solutions are not exact in a rigorous way, because we randomly sample the problem. However, it is possible to achieve nearly exact results using a relatively small number of samples compared to the problem's dimensions. Indeed, Monte Carlo methods are the only practical choice for evaluating problems of high dimensions.

John Nash describes the Simplex method for solving linear programming problems. (The use of the word *programming* here really refers to scheduling or


Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Markov-Kette

- Stochastische Übergänge
- Übergangswahrscheinlichkeit hängt nur vom Anfangs und Endzustand ab
- Dynamisches Sampeln



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Detailed Balance (Reversible Prozesse)

- Stationäre Verteilung $f(x)$
- Übergangswahrscheinlichkeit $M_{i \rightarrow j}$

$$M_{i \rightarrow j} f(x_i) = M_{j \rightarrow i} f(x_j)$$

$$\frac{M_{i \rightarrow j}}{M_{j \rightarrow i}} = \frac{f(x_j)}{f(x_i)}$$

Die Übergangswahrscheinlichkeit ist proportional zum Verhältnis der Zustände.

Metropolis Algorithmus

Die Übergangswahrscheinlichkeit

$$M_{i \rightarrow j} = \min \left(1, \frac{f(x_j)}{f(x_i)} \right)$$


erfüllt die *detailed balance*
Bedingung.

Generiere Zufallszahl: $\xi \in (0, 1]$

$$x_{i+1} = \begin{cases} x_j, & \text{wenn } \xi \leq M_{i \rightarrow j} \\ x_i, & \text{wenn } \xi > M_{i \rightarrow j} \end{cases}$$


Wie wird x_j bestimmt?

Zufälliges Ziehen aus einer festgelegten Schrittweitenverteilung




Bestimmung der Schrittweite

Starte am Punkt i




Bestimmung der Schrittweite

Ziehe nächsten Schritt aus Schrittvorschlags-PDF $g(x)$



Bestimmung der Schrittweite

Entscheide, ob Schrittvorschlag akzeptiert wird




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Bestimmung der Schrittweite

Ziehe nächsten Schritt aus der Verteilung g (anderer Mittelwert)



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Metropolis-Hastings Algorithmus

Schrittvorschlag bei
nicht-symmetrischer Verteilung

$g_{i \rightarrow j} > g_{j \rightarrow i}$
erfüllt nicht die *detailed balance*


Bedingung, aber

$$M_{i \rightarrow j} f(x_i) g_{i \rightarrow j} = M_{j \rightarrow i} f(x_j) g_{j \rightarrow i}$$

Erfüllt die Bedingung.

Die Übergangswahrscheinlichkeit ist

$$M_{i \rightarrow j} = \min \left(1, \frac{f(x_j) g(x_j | x_i)}{f(x_i) g(x_i | x_j)} \right)$$



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

MCMC Algorithmus

- Initialisiere: $t = 0$, Startpunkt x_0
- Wiederhole:
 1. Schlage Schritt vor: Ziehe x' aus $g(x|x_t)$
 2. Berechne Akzeptanzwahrscheinlichkeit:

$$p = \min \left(1, \frac{p(\bar{x}) g(x_t|\bar{x})}{p(x_t) g(\bar{x}|x_t)} \right)$$
 3. Akzeptanzschritt:
 1. Ziehe gleichverteilte Zufallszahl $\xi \in [0, 1)$
 2. Wenn $\xi \leq p$, akzeptiere $x' \Rightarrow x_{t+1} = x'$
 3. Sonst: Verwerfe $x' \Rightarrow x_{t+1} = x_t$
 4. Erhöhe: $t = t + 1$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Autokorrelation ↔ sampling efficiency

- Zu kleine Akzeptanzrate ($< 30\%$)
 - Zu kleine Landschaft der Verteilung wird erkundet
 - Wenige Punkte repräsentieren die Verteilung
 - ➡ Zu große Schrittweite
- Zu große Akzeptanzrate ($> 70\%$)
 - Viele Punkte nahe beinander
 - Flacher bereich der Verteilung
 - Verhältnis nahe 1
 - ➡ Zu kleine Schrittweite


Burn-In Phase

Szenario, wenn Startpunkt weit vom signifikanten Bereich entfernt liegt

- Flache Verteilung
- Großteil der Punkte nicht im signifikantem Bereich
- Findet signifikanten Bereich nicht

Ansatz

- Verwerfen der Burn-In Phase
- Ensemble von *Walkern*



Probleme und Ausblick


- Probleme
 - Kein unabhängiges Sampling
 - Startpunktabhängigkeit
 - Schrittweitenabhängigkeit

Weitere Ansätze/Modifizierungen

- Hamilton Monte-Carlo:
 - Berücksichtigt Zustand und Gradient
 - Analogon: potentielle Energie und kinetische Energie
 - Schrittweitenverteilung abhängig vom Gradienten


Monte-Carlo-Simulationen

- Welches von beiden Events ist simuliert, welches gemessen?




Monte-Carlo-Simulationen

Gemessen



Simuliert



Prof. Dr. Dr. W. Rhode


Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Analytische Simulationen (ohne Monte-Carlo)


- Analytisches Lösen von Differentialgleichungen
 - Aus dem Anfangszustand ist der Endzustand berechenbar
- ➔ Deterministisch

Doppelpendel
(Euler-Lagrange)




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Moleküldynamik
(Newton)



Generation von Zufallszahlen

Strömungen
(Navier-Stokes)



Statistische Methoden
der Datenanalyse

Monte-Carlo-Simulation

Stochastische Prozesse

Kein gleiches Verhalten bei gleichen Startbedingungen

Festkörperphysik:

- Ensemblesimulation
- Berechnung von Integralen, Mittelwerten durch Mittelung über zufällig gezogenen Stichproben
- Comp. Phys: Mittlere Energie eines 2D Ising-Modells

Teilchenphysik (hier im Fokus):

- Einzelsimulationen
- Zufälliges Generieren, Propagieren, Detektieren und Rekonstruieren von einzelnen Ereignissen
- Mittelung über statistische Prozesse hier nicht sinnvoll


Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Monte-Carlo-Simulationskette

- Ein Ereignis ist eine Überlagerung vieler komplexer Prozesse
Analytische Lösung des Gesamtprozesses nicht möglich
- Behandlung der einzelnen Prozesse getrennt voneinander
- Für jeden Schritt: Ziehe Zufallszahl aus Verteilung und bestimme Ergebnis
- Abdeckung des Parameterraums durch häufiges Wiederholen



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen


Statistische Methoden
der Datenanalyse

Warum wir Monte-Carlo-Simulationen brauchen

Beispiel: Muonspur im Detektor
Annahmen

- Konstante Muonenergie
- Gaußartige Abschwächung des Signals

Simulation ohne Monte-Carlo



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen


Statistische Methoden
der Datenanalyse

Warum wir Monte-Carlo-Simulationen brauchen

Beispiel: Muonspur im Detektor
Annahmen

- Konstante Muonenergie
- Gaußartige Abschwächung des Signals
- Poissonverteilte Photonhits

Simulation mit Monte-Carlo



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel

Initialisiere:

- Startposition
- Richtung
- Mittlere Absorptionslänge $\langle \lambda_{\text{abs}} \rangle$
- Mittlere Streulänge $\langle \lambda_{\text{scat}} \rangle$
- Mittlerer Streuwinkel $\langle \cos \theta \rangle$

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen


Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel

Ziehe exponentialverteilte Absorptions-
und Streulänge mit Inversionsmethode

$$p(x) = \frac{1}{\langle \lambda \rangle} e^{-x/\langle \lambda \rangle}$$




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen


Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel

Die Absorptions- und Streulänge sind exponentialverteilt

$$f(\cos \theta) = \frac{1 + \alpha}{2} \left(\frac{1 + \cos \theta}{2} \right)^\alpha, \alpha = \frac{2 \langle \cos \theta \rangle}{1 - \langle \cos \theta \rangle}$$




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Beispiel: Photonpropagation

1. Initialisierung
2. Ziehen der Absorptionslänge
3. Propagation und Streuung bis Absorptionslänge erreicht ist
 - I. Ziehen der Streulänge
 - II. Propagation zum nächsten Streupunkt
 - III. Ziehen des Streuwinkels
 - IV. Drehung um Streuwinkel




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Photon Propagation entlang eines Muonpfades



Hier noch keine stochastischen Verluste des Muons

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Teilchenpropagation

- Analog zur Photonpropagation
 - Absorption → Zerfall
 - Streuung → stochastischer Energieverlust + Streuung
 - + kontinuierliche Verluste

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Einschub: Ziehung der Zufallsereignisse aus Verteilung

- Photonpropagation
 - PDF invertierbar (Exponentialverteilung)
 - Inversionsmethode
- Muonpropagation
 - Komplexe Verteilungen (Wirkungsquerschnitte)
 - oftmals nur numerisch vorhanden
 - oder es muss zunächst integriert werden
 - Frage: Wie wird hier gesampelt?

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Einschub: Ziehung der Zufallsereignisse aus Verteilung

- Photonpropagation
 - PDF invertierbar (Exponentialverteilung)
 - Inversionsmethode
- Muonpropagation
 - Komplexe Verteilungen (Wirkungsquerschnitte) oftmais nur numerisch vorhanden oder es muss zunächst integriert werden
 - Frage: Wie wird hier gesampelt?
 - Inversionsmethode, da effizienter:
 - MC-Simulationen sind ressourcenintensiv
 - Großer MC Datensatz für Analysen notwendig
 - Interpolation statt Integration
 - Abspeichern von Tabellen statt Neuberechnung

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen


Statistische Methoden
der Datenanalyse

Warum wir Monte-Carlo-Simulationen brauchen

Beispiel: Muonspur im Detektor
Annahmen

- Konstante Muonenergie
- Gaußartige Abschwächung des Signals
- Poissonverteilte Photonhits
- Stochastische Energieverluste

Muon mit Energieverlusten



Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse


Warum wir Monte-Carlo-Simulationen brauchen

Beispiel: Muonspur im Detektor

Annahmen

- Konstante Muonenergie
- Gaußartige Abschwächung des Signals
- Poissonverteilte Photonhits
- Stochastische Energieverluste
- Geringe Auflösung

Detektor mit geringer Auflösung




Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse

Vollständige Monte-Carlo-Simulationskette

- Bisher nur Monte-Carlo-Propagation
- Generator
 - Energiespektrum der Teilchen
 - Teilchenfluss
- Detektor
 - Akzeptanzwahrscheinlichkeit
 - Trigger
 - Elektronik (z.B. weißes Rauschen)



- Vollständig simulierte Events entsprechen Messdaten
- Rekonstruktion des einzelnen Ereignisses

Prof. Dr. Dr. W. Rhode

Generation von Zufallszahlen

Statistische Methoden
der Datenanalyse