

# Problem izlaska iz šume

Katarina Krivokuća  
Matematička gimnazija, Beograd, Srbija  
e-mail: katarinakrivokuca@outlook.com

Dimitrije Glukčević  
Gimnazija „Svetozar Marković”, Niš, Srbija  
e-mail: dimchee90@gmail.com

October 20, 2019

## Apstrakt

Belmanov problem traženja najkraćeg izlanog puta iz šume poznatog oblika i dimenzija je rešen za mali broj šuma. Jedan od rešenih slučajeva je traka ograničena sa dve paralelne prave na jediničnoj udaljenosti. Tačnije, Zalgaler je pronašao najkraći put jedinične širine, a kasnije je pokazano da je to najkraći izlazni put iz posmatrane šume. Takođe su istraživani i najkraći putevi jedinične širine u višim dimenzijama. Gomi je pooštrio gornje ograničenje za dužinu takvog puta u prostoru i pronašao donje ograničenje za dužinu takvog puta u  $\mathbb{R}^n$ . U ovom radu ćemo predstaviti jedno gornje ograničenje za dužinu najkraćeg puta jedinične širine u  $\mathbb{R}^n$ , kao i jednu modifikaciju Belmanovog problema u kojoj više ljudi kreće iz iste tačke i smatra se da su izašli iz šume ako je barem jedan od njih izašao i za dužinu puta se smatra suma dužina pojedinačnih puteva. Dalje je pokazano jedno gornje i jedno donje ograničenje za dužinu najkraćeg puta jedinične širine u  $\mathbb{R}^n$  pri posmatranoj modifikaciji problema, kao i dokaz optimalnosti jedne modifikovane putanje u ravni pri restrikciji konveksnog omotača puta na trougao. Dosadašnji rad i intuicija ukazuju na to da je pri posmatranoj modifikaciji u  $\mathbb{R}^n$  najkraći put jedinične širine baš put za  $(n + 1)$ -nog čoveka konstruisan u ovom radu.

## 1 Uvod

### 1.1 Originalni problem

Originalni problem "Izgubljeni u šumi" je postavio Belman 1956. i on je glasio:

"Koji je najkraći put kojim čovek izgubljen u šumi poznatog oblika i dimenzija treba da ide tako da posle tog puta zna da će sigurno izaći iz nje?"

Formalnije, problem se definiše kao "Koji je najkraći izlazni put iz šume?", ako smo šumu i izlazni put definisali kao:

**Definicija 1.1** *Šuma je zatvoren, konveksan planaran skup.*

**Definicija 1.2** *Put je neprekidan i rektifiabilna planarna kriva.*

**Definicija 1.3** *Za put  $P$  kažemo da je izlazni put iz šume  $F$  ako se put  $P$  ne može postaviti unutar šume  $F$  bez presecanja njenog ruba.*

## 1.2 Neki poznati rezultati

Rešenje ovog problema je poznato za mali broj šuma. Da bi se definisale neke klase šuma za koje je problem rešen, potrebne su sledeće definicije:

**Definicija 1.4** *Za ograničenu šumu, dijametar se definiše kao najveća udaljenost između neke dve tačke šume.*

**Definicija 1.5** *Širina puta je najmanja udaljenost između neke dve paralelne prave takve da se taj put nalazi između njih.*

Tri klase šuma za koje je problem rešen su:

1. **"Debele" šume** iz kojih je najbolji izlazni put oblika duži. Šuma je "debela" ako je ograničena i pokriva neki romb sa uglom od  $60^\circ$  i velikom dijagonalom dužine svog dijametra.  
Neki primeri "debelih" šuma su kružnica i svi pravilni mnogouglovi sa više od 3 stranice.
2. **"Tanke" šume** iz kojih je najbolji izlazni put oblika Zalgalerove putanje, koja je najkraća putanja širine 1. Šuma je "tanka" ako se u nju može upisati Zalgalerov pravougaonik, tako da njegove duže stranice leže na rubu posmatrane šume. Zalgalerov pravougaonik je pravougaonik čija je kraća stranica 1, a duža dužine Zalgalerove putanje.  
Najpoznatiji primer "tanke" šume je šuma koju obrazuju dve paralelne prave na udaljenosti 1.
3. **Neki jednakokraki trouglovi** iz kojih je najbolji izlazni put Besikovičeva "Z" kriva.

## 1.3 Uopštenje problema

Prvo, uopštimo ovaj problem na višedimenzionalne prostore. Za to je samo potrebno predefinisati šumu i put tako da više ne "žive" u  $\mathbb{R}^2$ , već u  $\mathbb{R}^n$ .

**Definicija 1.6**  *$n$ -dimenziona šuma je zatvoren, konveksan skup u  $\mathbb{R}^n$ .*

**Definicija 1.7**  *$n$ -dimenzioni put je neprekidan i rektifikabilan luk u  $\mathbb{R}^n$ .*

**Definicija 1.8** *Za  $n$ -dimenzioni put kažemo da je izlazan iz  $n$ -dimenzione šume ako ne može biti postavljen unutar nje bez presecanja njenog ruba.*

**Definicija 1.9** *Širina  $n$ -dimenzionog puta je najmanja udaljenost između dve paralelne hiperravni takve da se taj put nalazi između njih.*

Drugo uopštenje koje će biti posmatrano u ovom radu je problem više ljudi unutar šume. U kontekstu originalnog problema, pitanje bi bilo postavljeno kao:

"Grupa od  $n$  ljudi je zajedno izgubljena unutar šume poznatog oblika i dimenzija. Koja je najmanja suma dužina puteva koje oni moraju da pređu tako da znaju da će barem jedan od njih izaći iz šume?"

Formalno, to bi se definisalo kao:

**Definicija 1.10** *Put za  $n$  ljudi je skup  $k$  puteva koji kreću iz iste tačke.*

**Definicija 1.11** *Dužina puta za  $n$  ljudi je suma dužina pojedinačnih puteva.*

**Definicija 1.12** *Za put za  $k$  ljudi  $P_n$  kažemo da je izlazan put iz šume  $F$  ako za bilo koji početni položaj, barem jedan od  $n$  puteva iz skupa izlazi iz  $F$ .*

Na primer, iz šume u  $\mathbb{R}^2$  ograničene sa dve prave na udaljenosti 1 je za jednu osobu najkraći izlazni put Zalgalerova putanja, koja je dužine oko 2.278291644, a za tri čoveka je jedan od izlaznih puteva čine tri duži dužine  $\frac{2}{3}$  pod uglovima od  $120^\circ$ . Ovaj izlazni put za 3 osobe ima dužinu 2, te je kraći od Zalgalerove krive.

Prirodno se postavlja sledeće pitanje:

”Grupa ljudi je zajedno izgubljena u šumi poznatih dimenzija. Koliko optimalno treba da ih bude, i koliki put moraju da pređu, tako da znaju da će izaći iz šume?”

Formalnije, ako je za šumu  $F$  dužina najkraćeg izlaznog puta za  $k$  ljudi  $S_k(F)$ , traži se:

$$S(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(F)$$

Ovaj limes je definisan jer je niz  $S_n(F)$  nerastući, jer u izlaznom putu za  $k + 1$  ljudi, jedan čovek može da stoji i stoga  $S_{k+1}(F) \leq S_k(F)$ . Ovaj niz je takođe ograničen odozdo nulom jer označava sumu nekih dužina, te ovaj limes mora da postoji.

## 1.4 Cilj rada

U ovom radu posmatramo uopštenje Belmanovog problema u  $\mathbb{R}^n$ , u originalnu, kao i pri modifikaciji za više ljudi navedenoj u prethodnom odeljku.

U odeljku 2.1 je pokazano koja je najmanja dužina stranice pravilnog simpleksa u  $\mathbb{R}^n$  koji se ne može smestiti između dve hiperravni na jediničnoj udaljenosti. Zatim su u odeljcima 2.2 i 2.3 uočene ”šetnje” po tom simpleksu koje su izlazne putanje iz šume ograničene sa dve paralelne hiperravni na jediničnoj udaljenosti u  $\mathbb{R}^n$  redom za jednog i  $(n + 1)$ -nog čoveka, čime su data dva gornja ograničenja za dužinu izlaznog puta iz ovih šuma- prvo važi za uopštenje originalnog problema, a drugo (koje je jače od prvog) važi za modifikaciju problema.

Nadalje se sve posmatra pri modifikovanoj verziji problema.

Treće poglavlje se bavi donjim ograničenjem za dužinu najkraćeg izlaznog puta iz šuma posmatranih u poglavlju 2,. U odeljku 3.1 je pokazano ograničenje koje važi nezavisno od toga koliko ljudi pokušava da pobegne iz šume, dok je u odeljku 3.2 pokazano ograničenje u funkciji od broja ljudi koji pokušavaju da pobegnu. Kako se broj ljudi povećava, tako se donje ograničenje smanjuje.

U četvrtom poglavlju su posmatrane šume koje su uočene kao drugi način da se u  $\mathbb{R}^n$  uopšti planarna šuma ograničena sa dve paralelne prave na jediničnoj udaljenosti. Pokazano je da je problem izlaska iz svake od tih šuma ekvivalentan problemu izlaska iz šume ograničene sa dve paralelne hiperravni na jediničnoj udaljenosti u prostoru neke druge (jedinstveno određene) dimenzije.

U petom poglavlju je posmatran problem izlaska iz planarne šume ograničene sa dve paralelne prave na jediničnoj udaljenosti. Pokazano je da je, pri restrikciji konveksnog omotača puta na trougao, najkraći put sa ma koliko ljudi baš konstruisani put sa tri osobe dužine 2.

## 2 Traka u $n$ dimenzija

Slično problemu šume oblika beskonačne trake, posmatraćemo šume u  $\mathbb{R}^n$  ograničene sa dve paralelne hiperravni na rastojanju 1. Ovako definisanu šumu u  $\mathbb{R}^n$  zovimo **trakom u  $n$  dimenzija** i označimo je sa  $T_n$ .

Šume ovog oblika su već posmatrane u kontekstu ispitivanja širina putanja, pošto važi ekvivalencija između toga da  $n$ -dimenzioni put ima širinu barem jedan i da je izlazna za šumu  $T_n$ . Gomi je 2018. pokazao da važi:

**Teorema 2.1 (Gomi)** *Neka je  $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$  rektifiabilan luk i neka je  $L$  njena dužina i  $\omega$  njena širina. Tada važi:*

$$\frac{L}{\omega} \geq \sqrt{2.2782^2 + 9(n-2)}$$

*Dalje, ako je  $\gamma$  zatvoren, važi:*

$$\frac{L}{\omega} \geq \sqrt{\pi^2 + 16(n-2)}$$

Stoga, donje ograničenje dužine izlaznog puta za jednog čoveka iz  $T_n$  je  $\sqrt{2.2782^2 + 9(n-2)}$ .

Zalgaler je konstruisao put u  $\mathbb{R}^3$  jedinične širine i dužine ne veće od 3.9215, što je blizu ograničenja 3.7669 dobijenog Teoremom 2.1.

**Predlog 2.2**  $S(T_n) = S_{n+1}(T_n) = \sqrt{n \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot (n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1)}$ .

Intuicija iza postavljanja ovog predloga je to što se na primerima  $\mathbb{R}^2$  i  $\mathbb{R}^3$  ispostavlja da je put posmatran dalje u ovom poglavlju sa 3, odnosno 4 osobe kraći od najkraćeg mogućeg puta za jednog čoveka. Takođe, konveksni omotač posmatranih puteva je simpleks u odgovarajućoj dimenziji, što je telo sa najmanje temena koje "živi" u posmatranom prostoru i posmatrani put iz centra simpleksa smatramo da će se ispostaviti za najkraći put čiji je ovo konveksni omotač, ma koliko ljudi da ga obrazuje.

### 2.1 Minimalan simpleks

Sledeće tvrđenje daje gornje ograničenje za najmanje dimenzije pravilnog  $n$ -simpleksa koji se ne može postaviti unutar trake u  $n$  dimenzija. Iz njega sledi gornje ograničenje za izlaznu putanju iz ovakve šume u  $\mathbb{R}^n$  za jednog čoveka, kao i gornje ograničenje tog puta za  $n+1$  ljudi.

**Tvrđenje 2.3** *Između dve hiperravni u  $\mathbb{R}^n$  na udaljenosti 1 se ne može postaviti pravilan  $n$ -simpleks stranice  $\sqrt{\frac{2\left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot (n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1)}{n+1}}$  tako da ga ni jedna od ove dve hiperravni ne seče.*

**Dokaz.** Posmatrajmo u  $\mathbb{R}^{n+1}$  simpleks određen temenima:

$$A_1 = (0, 0, 0, \dots, 0, 0)$$

$$A_2 = (-1, 1, 0, \dots, 0, 0)$$

...

$$A_{n+1} = (-1, 0, 0, \dots, 0, 1)$$

Ovaj simpleks, iako je definisan u  $\mathbb{R}^{n+1}$  ima  $n$  dimenzija, tj. pripada potprostoru  $\mathbb{R}^n$ .

Pošto želimo da nađemo maksimalan  $n$ -simpleks koji možemo postaviti unutar trake u  $n$  dimenzija, to je ekvivalentno tome da za fiksni  $n$ -simpleks nađemo minimalnu udaljenost između dva paralelna potprostora dimenzije  $n - 1$  takvih da kako god da simpleks stoji između njih, neka od njih sigurno seče posmatrani simpleks.

Posmatrajmo neki  $(n - 1)$ -dimenzioni potprostor koji sadrži teme  $A_1$  i pripada potprostoru generisanom tačkama  $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ , takav da su tačke  $A_2, A_3, \dots, A_{n+1}$  sa iste strane ovog potprostora. Neka je  $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_{n+1})$  jedinični vektor normalan na ovaj potprostor. Za njega takođe važi da pripada potprostoru generisanom tačkama  $A_1, A_2, \dots, A_{n+1}$ , te za njega važi da je linearna kombinacija vektora  $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \dots, \overrightarrow{A_1A_{n+1}}$ .

$$\lambda_2 \cdot \overrightarrow{A_1A_2} + \lambda_3 \cdot \overrightarrow{A_1A_3} + \dots + \lambda_{n+1} \cdot \overrightarrow{A_1A_{n+1}} = \vec{x}$$

Iz ovoga sledi da važi sistem jednačina:

$$-\lambda_2 - \lambda_3 - \dots - \lambda_{n+1} = x_1$$

$$\lambda_2 = x_2$$

$$\lambda_3 = x_3$$

...

$$\lambda_{n+1} = x_{n+1}$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + \dots + x_{n+1} = 0$$

Takođe, pošto je  $\vec{x}$  jediničan vektor normalan na posmatrani  $(n - 1)$ -dimenzioni potprostor, za svako  $i \in 2, 3, \dots, n + 1$ , skalarni proizvod  $\overrightarrow{A_1A_i} \cdot \vec{x}$  predstavlja rastojanje između temena  $A_i$  i posmatranog  $(n - 1)$ -dimenzionog potprostora. Neka su ova rastojanja redom  $l_2, l_3, \dots, l_{n+1}$ .

$$l_2 = (-1, 1, 0, \dots, 0) \cdot (x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n+1}) = x_2 - x_1$$

$$l_3 = x_3 - x_1$$

...

$$l_{n+1} = x_{n+1} - x_1$$

Pošto su  $A_2, A_3, \dots, A_{n+1}$  sa iste strane potprostora na koji je normalan vektor  $\vec{x}$ , ovi skalarni proizvodi su svi istog znaka. Bez umanjenja opštosti, recimo da su nenegativni. Predstavimo  $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$  u funkciji od  $l_2, l_3, \dots, l_{n+1}$ :

$$x_1 = -\frac{l_2 + l_3 + \dots + l_{n+1}}{n + 1}$$

$$x_2 = \frac{n \cdot l_2 - l_3 - l_4 - \dots - l_{n+1}}{n + 1}$$

$$x_3 = \frac{-l_2 + n \cdot l_3 - l_4 - \dots - l_{n+1}}{n+1}$$

$$\dots$$

$$x_{n+1} = \frac{-l_2 - l_3 - l_4 - \dots + n \cdot l_{n+1}}{n+1}$$

Pošto za vektor  $\vec{x}$  znamo da je jediničan, važi:

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n+1}^2 = 1$$

$$\Rightarrow \left( \frac{-l_2 - l_3 - \dots - l_{n+1}}{n+1} \right)^2 + \left( \frac{n \cdot l_2 - l_3 - \dots - l_{n+1}}{n+1} \right)^2 + \dots + \left( \frac{-l_2 - l_3 - \dots + n \cdot l_{n+1}}{n+1} \right)^2 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{(n+1)^2} \left[ (n^2 + n) \cdot \sum_{i=2}^{n+1} l_i^2 - (2n+2) \cdot \sum_{i=2, i < j}^{n+1} l_i \cdot l_j \right] = 1$$

$$\Rightarrow n \cdot \sum_{i=2}^{n+1} l_i^2 - 2 \cdot \sum_{i=2, i < j}^{n+1} l_i \cdot l_j = n+1$$

Problem je ovime sveden na naženje najveće udaljenosi na koju možemo da postavimo drugi  $(n-1)$ -dimenzioni potprostor paralelan posmatranom, tako da on sigurno seče posmatrani simpleks. Primetimo da je tražena udaljenost tačno minimum po svim posmatranim  $(n-1)$ -dimenzionim potprostorima od  $\max\{l_2, l_3, \dots, l_{n+1}\}$ .

Ekvivalentan problem tome bi bio, za neko fiksno  $t \in \mathbb{R}^+$  maksimizovati izraz:

$$n \cdot \sum_{i=2}^{n+1} l_i^2 - 2 \cdot \sum_{i=2, i < j}^{n+1} l_i \cdot l_j,$$

pri uslovu  $l_2, l_3, \dots, l_{n+1} \in [0, t]$ .

Fiksiranjem  $l_2, l_3, \dots, l_n$  dobijamo kvadratnu funkciju po  $l_{n+1}$ :

$$n \cdot l_{n+1}^2 - l_{n+1} \cdot 2 \sum_{i=2}^n l_i + \sum_{i=2}^n l_i^2 - 2 \sum_{i=2, i < j}^n l_i \cdot l_j$$

Pošto je u ovoj kvadratnoj koeficijent uz  $l_{n+1}^2$  pozitivan, grafik ove funkcije je konveksna parabola, te joj je na segmentu  $[0, l]$  maksimalna vrednost na jednom od krajeva segmenta, tj. maksimizuje se kada je  $l_{n+1}$  ili 0 ili  $l$ .

Analogno, svaki od  $l_2, l_3, \dots, l_n$  takođe treba biti ili 0 ili  $l$ . Sada treba maksimizovati ovaj izraz, pri uslovu:

$$l_2, l_3, \dots, l_{n+1} \in \{0, l\}.$$

Posmatrana suma može da se prezapiše kao:

$$\sum_{i=2, i < j}^{n+1} (x_i - x_j)^2 = n+1$$

Neka od ovih dužina  $a \in \mathbb{N}$  ima vrednost  $t$ , a  $n - a$  ima vrednost 0. Ubacivanjem toga u prethodno, dobija se:

$$(n - a)a \cdot l = n + 1$$

Pošto se  $l$  minimizuje kada se  $(n - a)a$  maksimizuje, a  $(n - a)$  i  $a$  imaju konstantan zbir, prema nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine, to se dešava kada je  $n - a = a$ . Ovo se može dostići kada je  $n$  parno, a kada je neparno, izraz se maksimizuje kada se  $a$  i  $n - a$  razlikuju za jedan. Stoga,  $a = \lceil \frac{n}{2} \rceil$ .

Time se dobija:

$$\begin{aligned} n \cdot \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot l^2 - 2 \cdot \left( \lceil \frac{n}{2} \rceil \right) \cdot l^2 &= n + 1 \\ \left( n \cdot \lceil \frac{n}{2} \rceil - \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( \lceil \frac{n}{2} \rceil - 1 \right) \right) \cdot l^2 &= n + 1 \\ \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( n - \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \right) \cdot l^2 &= n + 1 \\ \Rightarrow l &= \sqrt{\frac{n + 1}{\lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( n - \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \right)}} \end{aligned}$$

Pošto je stranica ovog simpleksa dužine  $\sqrt{2}$ , odnos stranice simpleksa i udaljenosti dva  $(n - 1)$ -dimenziona potprostora između kojih se taj simpleks ne može postaviti između njih je:

$$\frac{\sqrt{2}}{l} = \sqrt{\frac{2 \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( n - \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \right)}{n + 1}}$$

Stoga, između dva paralelna  $(n - 1)$ -dimenziona potprostora na udaljenosti 1 ne može da se postavi  $n$ -simpleks stranice  $\sqrt{\frac{2 \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( n - \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \right)}{n + 1}}$ .  
□

## 2.2 Jedan čovek

**Teorema 2.4** *Put koji formiraju po trojkama nekoplanarne ivice  $n$ -simpleksa čije su ivice dužine  $\sqrt{\frac{2 \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( n - \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \right)}{n + 1}}$  je izlazni put iz trake u  $n$  dimenzija i taj put ima dužinu:*

$$L_{n,1} = n \cdot \sqrt{\frac{2 \lceil \frac{n}{2} \rceil \cdot \left( n - \lceil \frac{n}{2} \rceil + 1 \right)}{n + 1}}.$$

**Dokaz.** Po Teoremi 2.1, ovaj simpleks se ne može postaviti između posmatranih potprostora, tj. rub šume seče simpleks, kako god ga postavili u šumi.

Pošto postoji put po nekomplanarnim ivicama simpleksa koji obilazi sva temena i on je neprekidan i konveksni omotač tog puta je baš ovaj simpleks. Zato što posmatrani simpleks izlazi iz ove šume, tj. jedan od ova dva  $(n - 1)$ -dimenziona potprostora ga seče, on mora da seče

i put čiji je taj simpleks konveksni omotač. Stoga, ova putanja je izlazna i ima dužinu:

$$L_{n,1} = n \cdot \sqrt{\frac{2 \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}{n+1}}.$$

□

Stoga, važi sledeće:

$$S_1(T_n) \leq L_{n,1} = n \cdot \sqrt{\frac{2 \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}{n+1}}$$

### 2.3 n+1 čovek

**Teorema 2.5** *Put koji formira  $n+1$  duži od centra do svih temena pravilnog  $n$ -simpleksa čije su ivice dužine  $\sqrt{\frac{2 \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}{n+1}}$  je izlazni put za  $n+1$  ljudi iz trake u  $n$  dimenzija i taj put ima dužinu:*

$$L_{n,n+1} = \sqrt{n \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}$$

**Dokaz.** Slično dokazu Teoreme 2.2, pošto svaki od  $n+1$  ljudi ide od centra posmatranog simpleksa do nekog od njegovih temena, tako da do svakog temena ide tačno jedan čovek, konveksni omotač skupa ovih puteva je baš taj simpleks. Pošto barem jedan od posmatranih  $(n-1)$ -dimenzionih potprostora seče konveksni omotač ovog puta, barem jedan od njih mora seći i taj put.

Odnos rastojanja između centra simpleksa i temena sa dužinom ivice je:

$$\frac{\sqrt{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^2 + n \cdot \frac{1}{n+1}^2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{n^2 + n}}{\sqrt{2} \cdot (n+1)}$$

Onda je rastojanje između centra i temena u simpleksu stranice  $\sqrt{\frac{2 \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}{n+1}}$  je:

$$L_{n,n+1} = \frac{1}{n+1} \cdot \sqrt{n \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}$$

Pošto svaki od  $n+1$  ljudi koji kreću iz centra ovog simpleksa ima put dužine  $S$ , ukupna dužina puta je:

$$L_{n,n+1} = \sqrt{n \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}$$



□

Stoga, važi sledeće:

$$S_{n+1}(T_n) \leq L_{n,n+1} = \sqrt{n \cdot \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil \cdot \left(n - \left\lceil \frac{n}{2} \right\rceil + 1\right)}$$

### 3 Donje ograničenje u $n$ dimenzija

Gomi je pokazao gornje ograničenje za dužinu puta širine 1. Konstruišimo put za jednog čoveka koji koristeći Gomijevo ograničenje, daje donje ograničenje za dužinu modifikovanog puta.

### 4 $k$ -traka u $n$ dimenzija

Traka u  $n$  dimenzija predstavlja upoštenje klasičnog primera šume u  $\mathbb{R}^2$  ograničene sa dve paralelne prave na udaljenosti 1. Ovo je upoštenje koje nastaje interpretacijom ove šume kao prostora ograničenog hiperravnima u nekom prostoru i u slučaju  $\mathbb{R}^2$  je to jedina takva šuma koju ima smisla posmatrati. U prostorima viših dimenzija od  $\mathbb{R}^2$  to nije slučaj.

Definišimo  **$k$ -traku u  $n$  dimenzija** za svako prirodno  $n$  i za svako  $1 \leq k \leq n-1$  kao šumu određenu svim tačkama iz  $\mathbb{R}^n$  na udaljenosti manjoj ili jednakoj  $\frac{1}{2}$  od nekog  $k$ -dimenzionog potprostora  $\mathbb{R}^n$ .

**Teorema 4.1** *Najkraća izlazna putanja iz  $k$ -trake u  $\mathbb{R}^n$  je ista kao najkraća izlazna putanja iz trake u  $\mathbb{R}^{k+1}$ .*

**Dokaz.** Posmatrajmo presek nekog potprostora dimenzije  $k+1$  i  $k$ -trake u  $n$  dimenzija. Kada bilo koji objekat projektujemo na neki drugi, njihov presek mora pripadati toj projekciji. Stoga, kada bismo projektovali  $k$ -traku u  $n$  dimenzija na posmatrani  $k+1$  podprostor, ovaj presek mora pripadati toj projekciji.

Neka je  $S$  jedinična sfera u  $\mathbb{R}^{n-k}$  i neka je  $P$  podprostor  $\mathbb{R}^k$  takvi da važi:

$$\text{Lin}(S) \cap \text{Lin}(P) = \emptyset,$$

gde za skup vektora  $A$  i vektorski prostor  $B$ , sa  $\text{Lin}(A)$  označavamo skup svih linearnih kombinacija vektora iz  $A$ , a sa  $\text{Lin}(B)$  linearnu kombinaciju vektora baze.

Tada je  $k$ -traka u  $n$  dimenzija zapravo  $\text{Lin}(S \cup P)$ .

Pošto je  $S$  jedinične širine, a  $P$  ima samo  $k$  dimenzija, tj. projekcija  $P$  na  $\mathbb{R}^{k+1}$  po  $(k+1)$ -voj dimenziji je širine 0, linearna kombinacija njihove unije je jedinične širine. Stoga, projekcija  $k$ -trake u  $n$  dimenzija na proizvoljan  $\mathbb{R}^{k+1}$  potprostor je širine 1, te se ne može pokriti trakom u  $(k+1)$ -noj dimenziji. Zbog toga je svaki izlazni put iz trake u  $(k+1)$ -noj dimenziji takođe i izlazni put iz  $k$ -trake u  $n$  dimenzija.

S druge strane, ako za proizvoljan vektor  $v \in S$  definišemo skup:

$$X_v = \{\lambda v + p | p \in P, |\lambda v| \leq \frac{1}{2}\},$$

tj.  $X + v$  je skup dobijen tako što sve vektore iz  $P$  saberemo sa svim vektorima iz  $S$  koji imaju isti pravac kao vektor  $v$ . Ovaj skup predstavlja traku u  $(k + 1)$ -noj dimenziji, stoga važi i da je izlazni put iz  $k$ -trake u  $n$  dimenzija takođe i izlazni put iz trake u  $(k + 1)$ -noj dimenziji.  $\square$

## 5 Traka u $\mathbb{R}^2$ sa proizvoljnim brojem ljudi

**Lema 5.1** *Za šumu  $F$  u  $\mathbb{R}^n$  važi:*

$$S_1(F) = S_2(F).$$

**Dokaz.** Za svaki izlazni put za jednog čoveka postoji ekvivalentan izlazni put za dvojicu jer ako dva čoveka krenu iz bilo koje tačke tog puta i u suprotnim smerovima ga prate, obrazovaće isti put. Slično, za svaki izlazni put za dva čoveka postoji ekvivalentan put za jednog čoveka tako što jedan čovek ide putem koji bi formirao da krene iz krajnje pozicije na putu jednog od dva čoveka i prati taj put do krajnje pozicije drugog.  $\square$

**Definicija 5.2** *Geometrijska medijana skupa tačaka  $S = \{X_1, X_2, \dots, X_m\}$ , gde su  $X_i \in \mathbb{R}^n$  je tačka  $M \in \mathbb{R}^n$  za koju važi:*

$$\arg \min_{M \in \mathbb{R}^n} \sum_{i=1}^m d(X_i, M),$$

gde je za  $A, B \in \mathbb{R}^n$   $d(A, B)$  Euklidska razdaljina između tačaka  $A$  i  $B$ .

**Definicija 5.3** *Toričelijeva tačka je geometrijska medijana trougla.*

Za Toričelijevu tačku su poznata svojstva:

1. Ako je u  $\triangle ABC$  jedan od uglova veći od  $120^\circ$ , Toričelijeva tačka  $\triangle ABC$  je teme tog ugla.
2. Ako su u  $\triangle ABC$  svi uglovi ne veći od  $120^\circ$ , Toričelijeva tačka  $\triangle ABC$  je tačka  $X$  takva da važi:

$$\angle AXB = \angle BXC = \angle CXA = 120^\circ$$

**Teorema 5.4** *Najkraći izlazni put iz  $T_2$  čiji je konveksni omotač trougao je dužine 2. Tačnije, to je put za troje ljudi koji kreću iz centra jednakostraničnog trougla i svaki čovek ide ka jednom od temena.*

**Dokaz.** Neka je konveksni omotač puta  $\triangle ABC$  i neka je početna tačka puta tačka  $X$  (unutar  $\triangle ABC$ ). Da bi ovo bio konveksni omotač posmatranog puta, neki od ljudi koji kreću iz  $X$  svakako moraju da u nekom trenutku prođu i kroz tačku  $A$ ,  $B$  i  $C$ . Kada bi iz tačke  $X$  kretalo više od 3 osobe, svakako neka tri čoveka (ili manje) od njih moraju da prođu kroz ova tri temena trougla, a ostali nikako ne doprinose obliku konveksnog omotača, te su bespotrebni, tj. kada svi ljudi osim te trojice koji prolaze kroz temena ne bi krenuli, put bi bio kraći. Stoga, optimalno je da krene najviše tri osobe.

Ako za  $\triangle ABC$  važi da su mu svi uglovi ne veći od  $120^\circ$ , Toričelijeva tačka je unutar trougla i „gleda” sve stranice trougla pod uglom od  $120^\circ$ . Put koji obrazuje troje ljudi koji kreću iz Toričelijeve tačke i svaki ide do jednog temena je kraći od bilo kog puta za jednog čoveka, jer bi taj put morao da prođe kroz sva temena, tj. najkraći put za jednog čoveka bi bio polazeći od jednog temena uz dve najkraće stranice, što je duže od puta iz Toričelijeve tačke (po definiciji

geometrijske medijane).

Stoga, neka je  $X$  Toričelijeva tačka  $\triangle ABC$ . Neka su  $h_a, h_b, h_c$  redom visine iz temena  $A, B, C$  i neka je  $x = |AX|, y = |BX|, z = |CX|$ . Da bi put sa ovim konveksnim omotačem bio izlazan iz  $T_2$ , mora važiti  $\min\{h_a, h_b, h_c\} \geq 1$ , s tim da se traži minimalna suma  $x+y+z$  pri kojoj to važi.

Problem minimizacije  $x + y + z$  pri uslovu  $\min\{h_a, h_b, h_c\} \geq 1$  je ekvivalentan problemu maksimizacije  $\min\{h_a, h_b, h_c\}$  ako fiksiramo  $x + y + z = c$ , za bilo koju pozitivnu konstantu  $c$ .

Bez umanjenja opšteg, neka je  $h_a \leq h_b \leq h_c$ , tj.  $x \leq y \leq z$ . Važi sledeće:

$$\begin{aligned} P(\triangle ABC) &= \frac{h_a \cdot BC}{2} = P(\triangle ABX) + P(\triangle BCX) + P(\triangle CAX) = \\ &= \frac{xy \cdot \sin(\angle AXB)}{2} + \frac{yz \cdot \sin(\angle BXC)}{2} + \frac{zx \cdot \sin(\angle CXA)}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot (xy + yz + zx) \\ &\implies h_a = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{xy + yz + zx}{2BC}. \end{aligned}$$

Kosinusna teorema primenjena na  $\triangle BCX$  daje:

$$BC = \sqrt{y^2 + z^2 - 2\cos(\angle BXC) \cdot yz} = \sqrt{y^2 + z^2 + yz}.$$

Ubacivanjem izraza za  $BC$  u izraz za  $h_a$  dobijamo izraz koji treba maksimizovati pri uslovu  $x \leq y \leq z$ :

$$h_a = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{xy + yz + zx}{\sqrt{y^2 + z^2 + yz}} \leq \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{xy + yz + zx}{\sqrt{xy + yz + zx}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \sqrt{xy + yz + zx}.$$

Pošto je  $x+y+z = c$  i ovi brojevi predstavljaju dužine, tj. nenegativni su, prema nejednakosti između aritmetičke i geometrijske sredine važi:

$$\begin{aligned} xy + yz + zx &\leq x^2 + y^2 + z^2 \\ \implies xy + yz + zx &\leq \frac{1}{3} \cdot (x + y + z)^2 = \frac{1}{3} \cdot c^2 \\ \implies \sqrt{xy + yz + zx} &\leq \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot c. \end{aligned}$$

Maksimum se dostiže za  $x = y = z$  i tada je:

$$1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{xy + yz + zx} = \frac{1}{2} \cdot c,$$

tj.  $c = 2$ . Ovo je slučaj gde je  $\triangle ABC$  jednakokraničan i  $X$  je njegov centar.

Ako je neki od uglova  $\triangle ABC$  veći od  $120^\circ$ , Toričelijeva tačka je ono teme u kom se spajaju dve najkraće stranice. Neka bez umanjenja opšteg važi  $\angle BAC > 120^\circ$ .

Ponovo je uslov da ovaj put bude izlazan iz  $T_2$  da su sve visine ovog trougla dužine barem 1, tj. da je  $h_a \geq 1$  i važi:

$$P(\triangle ABC) = \frac{1}{2}h_a \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot CA \cdot \sin(\angle BAC)$$

$$\implies h_a = \frac{AB \cdot CA \cdot \sin(\angle BAC)}{BC} = \sin(\angle CBA) \cdot AB \geq 1$$

Pošto je  $\angle BAC > 120^\circ$ , tada je  $\angle CBA < 30^\circ$ , tj.  $\sin(\angle CBA) < \frac{1}{2}$ , mora važiti  $AB > 2$ , te mora važiti i  $AB + CA > 2$ , te ovaj slučaj ne može biti bolji od prethodnog, čime je dokaz kompletan.

□

## Literatura

- [1] J. W. Ward, *Exploring the Bellman Forest Problem*, Spring (2008)
- [2] S. R. Finch, J. E. Wetzel, *Lost in a forest*, The American Mathematical Monthly, 111(8) : 645-654 (2004)
- [3] M. Ghomi, *The length, width, and inradius of space curves*, arXiv preprint(2018), arXiv: 1605.01144v3
- [4] S. Finch, *A translation of Zalgaller's "The shortest space curve of unit width" (1994)* arXiv preprint(2019), arXiv:1910.02729
- [5] P. Gibbs, *Bellman's Escape Problem for Convex Polygons*, viXra:1606.0050 (2016)
- [6] P. Gibbs, *Lost in a Isosceles Triangle*, viXra:1606.0015 (2016)
- [7] Y. Movshovich, J. E. Wetzel, *Drapeable unit arcs fit in the unit  $30^\circ$  sector*, Adv. Geom. 17: 497–506 (2017)