

(Höhere Grundlagen) Kategorien

v5.0.1.0.4 Natürliche Transformationen

Kategory GmbH & Co. KG

Präsentiert von Jörg Kunze

Copyright (C) 2023 Kategory GmbH & Co. KG

BESCHREIBUNG

Inhalt. Natürliche Transformationen sind Morphismen zwischen Funktoren. Dabei wird der Quell-Funktor mit den Mitteln, nämlich Morphismen, der Ziel-Kategorie in den Ziel-Funktor überführt. Wir können also sagen, dass die beiden Funktoren „innerhalb“ der Ziel-Kategorie vergleichbar sind.

Diese sind uns bereits beim Thema Morphismen zwischen Morphismen aufgefallen als ein oft (aber nicht immer) wiederkehrendes Prinzip.

Ein Funktor ist das Finden der Form oder Figur der Quell-Kategorie in der Ziel-Kategorie. Zwei Funktoren der selben Quell-Kategorie entspricht also dem Finden von zwei Figuren der selben Form in der Ziel-Kategorie. Falls eine natürliche Transformation von dem einen Funktor in den andern existiert, dann können wir die eine Figur innerhalb der Ziel-Kategorie in die andere überführen.

So wie wir zwei homotope Wege innerhalb des Trägerraumes ineinander überführen können. Natürliche Transformationen und Homotopien liegen also intuitiv sehr nahe bei einander.

Algebraisch ist eine natürliche Transformation eine Familie von Morphismen in der Ziel-Kategorie und zwar für jedes Objekt der Quell-Kategorie einer. Diese Morphismen müssen mit den Bilder der Morphismen der Quell-Kategorie in der Ziel-Kategorie kommutieren.

Das führt dazu, dass die Funktoren von C nach D als OBJEKTE und die natürlichen Transformationen als HOMOMORPHISMEN die Axiome einer Kategorie erfüllen. Wir nennen die Funktorkategorie D hoch C .

Somit können wir uns natürliche Transformationen auch als Kategorien-Homomorphismen denken. Dies ist allerdings insofern problematisch, als dann einige Objekte keine Mengen (also mathematische Objekte) sind. Wollen wir diese Intuition präzisieren, so bilden wir eine Kategorie der kleiner Kategorien. Dann stimmt auch dieser Begriff ohne Probleme.

Ein natürlicher Isomorphismus zwischen zwei Funktoren ist eine natürliche Transformation mit einer weiteren natürlichen Transformation, die das Inverse ist. Dem entspricht dann dem Finden von zwei identischen Figuren, die wir innerhalb der Kategorie ineinander überführen können.

Präsentiert. Von Jörg Kunze

Voraussetzungen. Axiome der Kategorien, Funktor.

Text. Der Begleittext als PDF und als LaTeX findet sich unter <https://github.com/kategory/kategoryMathematik/tree/main/v5.0.1%20H%C3%B6here%20Grundlagen/v5.0.1%20Kategorien/v5.0.1.0.4%20Nat%C3%BCrliche%20Transformationen>

Meine Videos. Siehe auch in den folgenden Videos:

v5.0.1.0.3 (Höher) Kategorien - Funktoren

<https://youtu.be/Ojf5LQGeyOU>

v5.0.1.0.3.5 (Höher) Kategorien - Kategorien von Homomorphismen

<https://youtu.be/v1F5BFH8nbo>

v5.0.1.0.3 (Höher) Kategorien - Funktoren

<https://youtu.be/Ojf5LQGeyOU>

Quellen. Siehe auch in den folgenden Seiten:

https://de.wikipedia.org/wiki/Nat%C3%BCrliche_Transformation

<https://ncatlab.org/nlab/show/natural+transformation>

https://en.wikipedia.org/wiki/Category_of_small_categories

<https://ncatlab.org/nlab/show/small+category>

<https://de.wikipedia.org/wiki/Homotopie>

<https://ncatlab.org/nlab/show/natural+isomorphism>

<https://www.youtube.com/watch?v=Ir-DieCNUmA>

Buch. Grundlage ist folgendes Buch:

„Categories for the Working Mathematician“

Saunders Mac Lane

1998 | 2nd ed. 1978

Springer-Verlag New York Inc.

978-0-387-98403-2 (ISBN)

<https://www.amazon.de/Categories-Working-Mathematician-Graduate-Mathematics/dp/0387984038>

„Topology, A Categorical Approach“

Tai-Danae Bradley

2020 MIT Press

978-0-262-53935-7 (ISBN)

<https://www.lehmanns.de/shop/mathematik-informatik/52489766-9780262539357-topology>

Einige gut Erklärungen finden sich auch in den Einführenden Kapitel von

„An Introduction to Homological Algebra“

Joseph J. Rotman

2009 Springer-Verlag New York Inc.

978-0-387-24527-0 (ISBN)

<https://www.lehmanns.de/shop/mathematik-informatik/6439666-9780387245270-an-introduction-to-homological-algebra>

Lizenz. Dieser Text und das Video sind freie Software. Sie können es unter den Bedingungen der GNU General Public License, wie von der Free Software Foundation veröffentlicht, weitergeben und/oder modifizieren, entweder gemäß Version 3 der Lizenz oder (nach Ihrer Option) jeder späteren Version.

Die Veröffentlichung von Text und Video erfolgt in der Hoffnung, dass es Ihnen von Nutzen sein wird, aber OHNE IRGENDNEINE GARANTIE, sogar ohne die implizite Garantie der MARKTREIFE oder der VERWENDBARKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Details finden Sie in der GNU General Public License.

Sie sollten ein Exemplar der GNU General Public License zusammen mit diesem Text erhalten haben (zu finden im selben Git-Projekt). Falls nicht, siehe <http://www.gnu.org/licenses/>.

Das Video. Das Video hierzu ist zu finden unter [huhu](#)

1. NATÜRLICHE TRANSFORMATION

Seien im Folgenden \mathcal{C}, \mathcal{D} zwei Kategorien und $\mathcal{F}, \mathcal{G}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ zwei Funktoren mit \mathcal{C} als Quell- und \mathcal{D} als Ziel-Kategorie.

1.1. Definition einer natürlichen Transformation.

Definition 1.1.1. (Natürliche Transformation): Eine natürliche Transformation

$$(1) \quad \alpha: \mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}$$

ist eine Schar von Homomorphismen in der Ziel-Kategorie \mathcal{D} mit Index die Objekte der Quell-Kategorie \mathcal{C} :

$$(2) \quad (\alpha_X: \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X))_{X \in \mathcal{C}}.$$

mit denen jeweils die Bilder der Objekte der Quell-Kategorie verbunden werden. Diese müssen mit den Bildern der Morphismen in dem Sinne verträglich sein, dass alle Diagramme der folgenden

Art, d.h. für alle $f: X \rightarrow Y$, mit $f \in \mathcal{C}$, kommutativ sind:

$$(3) \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(X) & \xrightarrow{\alpha_X} & \mathcal{G}(X) \\ \downarrow \mathcal{F}(f) & & \downarrow \mathcal{G}(f) \\ \mathcal{F}(Y) & \xrightarrow{\alpha_Y} & \mathcal{G}(Y) \end{array}$$

Eine Schar ist nur ein anderes Wort für Familie oder Funktion. Hier müssen wir auch Klassen-Funktionen zulassen, da die Klasse der Objekte der Quell-Kategorie durchaus eine echte Klasse sein kann. In unseren Gemälden sagen wir das so:

$$(4) \quad \mathcal{C} \begin{array}{c} \xrightarrow{\mathcal{F}} \\ \Downarrow \alpha \\ \xrightarrow{\mathcal{G}} \end{array} \mathcal{D}$$

Wir haben nun drei Arten von Pfeilen: die zwischen Objekten, die zwischen Kategorien und die zwischen Funktoren. Die Pfeile zwischen Funktoren sind dabei eigentlich Scharen von Pfeilen zwischen Objekten.

1.2. Zweimaliges Finden einer Form. Sei \mathcal{C} die Quell-Kategorie der Funktoren \mathcal{F} und \mathcal{G} , die die selbe Ziel-Kategorie \mathcal{D} haben. Dies können wir so beschreiben, dass \mathcal{C} eine Form oder Figur ist, die wir in \mathcal{D} wiederfinden. Bei zwei Funktoren handelt es sich also um ein zweimaliges Finden einer Form.


Sei z.B. \mathcal{C} folgende Kategorie mit drei Objekten (wir lassen die Identitäten weg):

$$(5) \quad \begin{array}{ccc} X & & \\ \downarrow & \searrow & \\ & Y & \\ & \swarrow & \\ & Z & \end{array}$$

Die Ziel-Kategorie hat die Objekte A, B, C, D, E, F und sei wie folgt.

$$(6) \quad \begin{array}{ccccc} A & & & D & \\ \downarrow & \searrow & & \downarrow & \searrow \\ & B & & & E \\ & \swarrow & & \downarrow & \swarrow \\ C & & & F & \end{array}$$


Betrachten wir nun die folgenden zwei Funktoren \mathcal{F} und \mathcal{G}




Diese finden beide die Dreiecksform als Teil der Ziel-Kategorie. Wir können aber keine natürliche Transformation finden, da Morphismen von $A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$ und $C \rightarrow F$ fehlen. Es gibt ein Loch in der Ziel-Kategorie, welches das Überführen der einen gefundenen Form in die zweite innerhalb der Ziel-Kategorie verhindert.

Neben den Lücken, weil es gar keinen Morphismus gibt, kann es auch noch das Problem geben, dass die entstehenden Diagramme (3) nicht kommutativ sind.

Geben wir unserer Ziel-Kategorie wie im nächsten Gemälde gezeigt vier Morphismen, so existiert eine natürliche Transformation $\mathcal{F} \Rightarrow \mathcal{G}$.



1.3. Das erinnert sehr an Homotopie. Das Loch oder die Lücke, die verhindert, dass wir eine Figur innerhalb des Ziels in die anderen überführen können, erinnert sehr an nicht homotope Kurven.



In dieser Situation, in der der topologische Raum der Betrachtung der graue Bereich ist, kann der Quell-Kreis A in den Ziel-Kreis B innerhalb der grauen Fläche deformiert werden. A kann aber nicht in C überführt werden, da das Loch L im Weg ist. A und B sind homotop A und C nicht.

TODO: Funktor Kategorie

TODO: Ein paar Worte zum Wort natürlich

TODO:

2. TODO

Noch zu erledigen sind

- $\text{Hom}(\dots)$ in D^C schreiben wir $\text{Nat}(\dots)$
- Wie schreiben wir D^C noch? Wenn es noch eine weitere Schreibweise gibt.
- Beispiel homotope und nicht homotope Kreise
- Natürlichkeit ist ein kategorieller Begriff und erfordert eine präzise Angabe der vorliegenden Daten: Quell, Ziel, Funktor und Schar von Morphismen.
- Kategorien von Prägarben

LITERATUR

- [MacLane1978] Saunders Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, Springer-Verlag New York Inc., 978-0-387-98403-2 (ISBN)
- [Bradley2020] Tai-Danae Bradley, *Topology, A Categorical Approach*, 2020 MIT Press, 978-0-262-53935-7 (ISBN)
- [Rotman2009] Joseph J. Rotman, *An Introduction to Homological Algebra*, 2009 Springer-Verlag New York Inc., 978-0-387-24527-0 (ISBN)

SYMBOLVERZEICHNIS

A, B, C, \dots, X, Y, Z	Objekte
F, G, L, R	Funktoren
f, g, h, r, s, \dots	Homomorphismen
$\mathcal{C}, \mathcal{D}, \mathcal{E}, \dots$	Kategorien
Set	Die Kategorie der Mengen
$\text{Hom}(X, Y)$	Die Menge der Homomorphismen von X nach Y
\mathbb{K}	Ein Körper
V, W, \dots	\mathbb{K} -Vektorräume
α, β, \dots	Skalare des Vektorraums also Elemente aus \mathbb{K}
V^*, W^*, \dots	Dualräume