

Русик. Скелетное разложение

Теорема. Пусть $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$

$\text{rk}(A) = r$. Тогда $\exists U \in \mathbb{F}^{m \times r}$, $V \in \mathbb{F}^{n \times r}$

$$A = U \cdot V^T = u_1 \cdot v_1^T + \dots + u_r \cdot v_r^T \quad m \cdot n \gg m \cdot r \quad n \cdot r$$

при $r \ll m, n$

Док-во: u_1, \dots, u_r , $U = (u_1, \dots, u_r)$, $S \in \mathbb{F}^{r \times r}$

$$A^{(r)} = U \cdot X \Rightarrow A = U \cdot (x_1, \dots, x_n) = U \cdot V^T = (US)(S^{-1}V^T) = \bar{U} \cdot \bar{V}^T$$

CUR-разложение

Теорема: $A \in \mathbb{F}^{m \times n}$, $\text{rk}(A) = r$

Пусть \hat{A} - невырожденная $r \times r$ подматрица

Тогда $A = C \cdot \hat{A}^{-1} \cdot R$ $m \cdot r + r \cdot r + n \cdot r = (m+n)r + r^2 \ll m \cdot n$

$$\begin{pmatrix} \text{dots} \end{pmatrix}_{m \times n} = \begin{pmatrix} \text{vertical ellipses} \end{pmatrix}_{m \times r} \cdot \begin{pmatrix} \text{circles} \end{pmatrix}_{r \times r} \cdot \begin{pmatrix} \text{horizontal ellipses} \end{pmatrix}_{r \times n}$$

$A \quad C \quad \hat{A}^{-1} \quad R$

Док-во: $\exists X: A = C \cdot X$ $R = \hat{A} \cdot X \Rightarrow X = \hat{A}^{-1} \cdot R$
 $\Rightarrow A = C \cdot \hat{A}^{-1} \cdot R$

Теорема. $\hat{A} \in \mathbb{F}_{r \times r}$: $|\det \hat{A}| \rightarrow \max$

Тогда R - строки \hat{A} , C - столбцы \hat{A}

$$\|A - C\hat{A}^{-1}R\|_c \leq (r+1)\sigma_{r+1}(A)$$

$$\|A\|_c = \max |a_{ij}|$$

Рассказ о контексте

Примеры

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{rk}(A) = 1 \quad \hat{A} = 2 \quad \hat{A}^{-1} = 1/2$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad R = (2 \ 2 \ 2)$$

Упр: Сделать
 $A \in \mathbb{F}^{2 \times 3}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{rk}(A) = 2 \quad U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{Не экономим} \quad \approx C$$

Спектральное разложение: $A = S \cdot \Lambda \cdot S^{-1}$

$$A \in \mathbb{F}^{n \times n} \quad \mathbb{F} = \mathbb{R}; \mathbb{C} \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

Существует не всегда

Критерий существования: $\sum \dim(\text{собственных подпрост.}) = n$

Жорданова форма: $A = S \cdot J \cdot S^{-1}$, где

$$J = \begin{pmatrix} J_1(\lambda_1) & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_k(\lambda_k) \end{pmatrix} \quad J_i(\lambda_i) = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & & 0 \\ & \lambda_i & 1 & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_i \end{pmatrix} \quad \text{Жорданов блок}$$

$\mathbb{F} = \mathbb{R} \Rightarrow \exists$ не всегда (т.к. хар. многочлен не всегда имеет n вещ. корней)
 $\mathbb{F} = \mathbb{C} \Rightarrow \exists$ всегда

Теорема (разложение Шура)

$\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} \exists U \in U(n); \text{ верхнетреуг. } T \in \mathbb{C}^{n \times n}$

$A = U \cdot T \cdot U^*$, причем на глав. диагонали T стоят собств. числа матрицы A

Док-во (по индукции) $n=1$ \checkmark

Зафиксируем n . \exists хотя бы одно собств. значение λ_1 и соотв. вектор $V_1 \Rightarrow$ можем дополнить V_1 до ортонорм. базиса $\mathbb{C}^n: \{V_1, V_2, \dots, V_n\} \Rightarrow$

Рассмотрим $U_1 = (V_1 \ V_2 \ \dots \ V_n) \in U(n)$

$$U_1^* A U_1 = (V_1^* \ \dots \ V_n^*)^T \cdot A \cdot (V_1 \ \dots \ V_n) = \begin{pmatrix} V_1^* A V_1 & V_1^* A V_2 & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots \\ V_n^* A V_1 & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

предположение индукции

$$A_1 = U_2 T_2 U_2^*, \text{ где } T_2 - \text{верхнетреуг.}, U_2 \in U(n-1)$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda_1 & B \\ 0 & A_1 \end{pmatrix}$$

$A_1 \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_1 & B \\ 0 & T_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U_2^* \end{pmatrix}$$

$\uparrow U(n) \qquad \qquad \qquad \uparrow U(n)$

Нормальные матрицы

Опр. $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ называется нормальной, если $A^* A = A A^*$
(Примеры: эрмитовы $A^* = A$; унитарные $A^* = A^{-1}$; антиэрмитовы $A^* = -A$)

Теорема. A -нормальная \Leftrightarrow унитарно подобна диагон.

(т.е. разложение Шура верхнетреуг. матрица будет диагональной $A = U \cdot \Lambda \cdot U^{-1}, U \in U(n)$)

Док-во. (\Leftarrow) Пусть $A = U \cdot \Lambda \cdot U^{-1}$

$$A^* A = (U \Lambda U^{-1})^* (U \Lambda U^{-1}) = (U^{-1})^* \Lambda^* U^* U \Lambda U^{-1} = U \Lambda^* \Lambda U^{-1} \uparrow =$$

$$A A^* = (U \Lambda U^{-1}) (U \Lambda U^{-1})^* = U \Lambda U^{-1} (U^{-1})^* \Lambda^* U^* = U \Lambda \Lambda^* U^{-1} \uparrow =$$

$\Rightarrow A^* A = A A^*$. Воспользуемся разложением Шура $A = U T U^*$.

$$(U T U^*)^* (U T U^*) = (U T U^*) (U T U^*)^*$$

$$U T^* \underbrace{U^* U}_I T U^* = U T \underbrace{U^* U}_I T^* U^* \quad U^{-1} \cdot I \sim I \cdot U$$

$$T^* T = T T^*, \text{ где } T - \text{верхнетреуг.} \quad x^* x = |x|^2 \neq x \cdot x^*$$

$\Downarrow ?$
по индукции: $n=1$ верно

Фиксируем n

$$T = \begin{pmatrix} a & x^* \\ 0 & C \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\begin{matrix} \boxed{a} & \boxed{x^*} \\ \boxed{0} & \boxed{C} \end{matrix}$

$\begin{matrix} \boxed{C}^{(n-1)(n-1)} \end{matrix}$

$$T^* T = \begin{pmatrix} \bar{a} & 0 \\ x & C^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & x^* \\ 0 & C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^2 & \bar{a} x^* \\ x a & x x^* + C^* C \end{pmatrix}$$

$$T T^* = \begin{pmatrix} a & x^* \\ 0 & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{a} & 0 \\ x & C^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |a|^2 + |x|^2 & x^* C^* \\ C x & C C^* \end{pmatrix}$$

$$|x|^2 = 0 \Rightarrow x = 0; \quad C^* C = C C^* \Rightarrow C - \text{диаг.}$$

$\Rightarrow T$ - диагональн. \boxtimes

Следствие: A - эрмитова $\Leftrightarrow A$ - нормальная
все собственные значения - веществ.

- A - унитарная $\Leftrightarrow A$ - нормальная; $|\lambda_i| = 1$
- A - косоэрмит. $\Leftrightarrow A$ - нормальная; λ_i - чистое мнимое

Приложение Маш (презент. + доска)

• • •

Частный случай

A - норм. \Rightarrow собств. вектора ортонорм.

Намем \mathcal{R}_1, V_1 $\mathcal{A} - \mathcal{R}_1 \cdot V_1 \cdot V^*$

$$(\mathcal{A} - \mathcal{R}_1 V_1 V_1^*) V_2 = \mathcal{A} \cdot V_2 = \mathcal{R}_2 \cdot V_2$$