

Escala CRIES

Ferramenta essencial para avaliação da dor em recém-nascidos, com foco na necessidade de suporte e analgesia.

NOME DO RECÉM-NASCIDO:

PRONTUÁRIO / ID:

IDADE GESTACIONAL / DIAS:

SETOR / LEITO:

DATA DA AVALIAÇÃO:

COLE A
ETIQUETA
AQUI

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO CLÍNICA

#	PARÂMETRO AVALIADO	PONTUAÇÃO / CRITÉRIO
1	C - Choro (Crying) <i>Avalia a presença e intensidade do choro.</i>	☐ 0 - Ausente ☐ 1 - Alto (estridente) ☐ 2 - Incontrolável
2	R - Necessidade de O₂ (Requires O₂) <i>Suporte necessário para manter SpO₂ > 95%.</i>	☐ 0 - Não necessita (Ar ambiente) ☐ 1 - Necessita FiO ₂ < 30% ☐ 2 - Necessita FiO ₂ > 30%
3	I - Sinais Vitais (Increased Vital Signs) <i>Elevação de FC e PA em relação à linha de base.</i>	☐ 0 - Na linha de base ou abaixo ☐ 1 - Aumento < 20% da linha base ☐ 2 - Aumento > 20% da linha base
4	E - Expressão Facial (Expression) <i>Sinais visuais de dor ou desconforto.</i>	☐ 0 - Relaxada ☐ 1 - Careta (dor intermitente) ☐ 2 - Contorcida / Grito silencioso
5	S - Sono / Insônia (Sleeplessness) <i>Avalia o padrão de vigília do RN.</i>	☐ 0 - Dorme continuamente ☐ 1 - Acorda frequentemente ☐ 2 - Acordado constantemente

ESCORE CRIES REGISTRADO

/ 10 pts

Interpretação Clínica:

- 0 pts: Ausência de Dor.
- 1 a 3 pts: Dor Leve. Priorizar medidas não farmacológicas (sucção, enrolamento).
- 4 a 6 pts: Dor Moderada. Considerar analgesia farmacológica.
- 7 a 10 pts: Dor Intensa. Recomenda-se analgesia imediata.