

Escore CURB-65

Avalia a gravidade da pneumonia adquirida na comunidade (PAC), orientando a decisão sobre o local ideal de tratamento.

NOME DO PACIENTE:

PRONTUÁRIO / ID:

IDADE:

SETOR / LEITO:

DATA DA AVALIAÇÃO:

COLE A
ETIQUETA
AQUI

CRITÉRIOS CURB-65

#	SINAL CLÍNICO / CRITÉRIO	PONTUAÇÃO	
1	C - Confusão Mental <i>Desorientação de tempo, pessoa ou lugar.</i>	☐ Ausente (0 pts)	☐ Presente (1 pt)
2	U - Ureia <i>Nível de ureia no sangue > 50 mg/dL (BUN > 19 mg/dL).</i>	☐ Normal (0 pts)	☐ Elevada (1 pt)
3	R - Frequência Respiratória <i>Frequência respiratória ≥ 30 incursões por minuto.</i>	☐ < 30 irpm (0 pts)	☐ ≥ 30 irpm (1 pt)
4	B - Pressão Arterial (Blood Pressure) <i>PAS < 90 mmHg ou PAD ≤ 60 mmHg.</i>	☐ Normal (0 pts)	☐ Baixa pressão (1 pt)
5	65 - Idade <i>Paciente tem 65 anos ou mais.</i>	☐ < 65 anos (0 pts)	☐ ≥ 65 anos (1 pt)

ESCORE CURB-65 FINAL

/ 5 pts

Interpretação e Conduta Clínica:

- **0 a 1 pt:** Baixo Risco (Mortalidade: ~1.5%). Tratamento ambulatorial.
- **2 pts:** Risco Moderado (Mortalidade: ~9.2%). Considerar internação ou observação (enfermaria).
- **3 a 5 pts:** Alto Risco (Mortalidade: ~22% a 57%). Internação hospitalar imediata. Se escore ≥ 4, considerar avaliação urgente para admissão em UTI.

CARIMBO E ASSINATURA PROFISSIONAL
AVALIADOR

Médico(a) / Enfermeiro(a) Responsável

DATA E HORA DA AVALIAÇÃO

Evolução Clínica / Decisão Terapêutica