

CONCURSO PÚBLICO Nº 081/2025
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS – UNICAMP

PROVA ESCRITA OBJETIVA

ENFERMEIRO – PERFIL ENFERMEIRO

ABRA APENAS QUANDO AUTORIZADO.

É PERMITIDA SOMENTE A UTILIZAÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE COR PRETA.

Leia com atenção as seguintes instruções:

1. Este caderno de questões contém **50 questões** de múltipla escolha, constituídas de 5 alternativas de resposta, das quais somente uma deve ser assinalada no cartão-resposta. Este caderno é composto por: 10 questões de Conhecimentos Gerais e 40 questões de Conhecimentos Específicos.
Quando autorizado, folheie o caderno de questões e, caso haja algum problema, informe ao fiscal de sala.
2. Confira as informações no cartão-resposta, especialmente os seus dados pessoais e o cargo público/perfil para qual está concorrendo. O cartão-resposta deve ser assinado e não deve ser dobrado, amassado ou rasurado.
3. Ao transferir as respostas para o cartão-resposta, marque com caneta de tinta de cor preta a letra correspondente à alternativa escolhida. A troca do cartão não será permitida em caso de marcação incorreta.
4. Durante a prova, não é permitido o uso de dispositivos eletrônicos de qualquer tipo, nem de celulares, relógios e materiais de consulta, tampouco o uso de lápis, lápis-borracha, lapiseira, borracha e corretivo.
5. A saída definitiva da sala de prova só será permitida após decorridas **2 horas** do início da prova (conforme o horário registrado na sala) e após a entrega obrigatória ao fiscal de sala:
 - do seu cartão-resposta personalizado;
 - do seu caderno de questões, completo.
6. Encerrada sua prova, o candidato deverá devolver seu caderno de questões completo ao fiscal de sala de provas e deverá deixá-la levando consigo somente o material fornecido pela FUNCCAMP para conferência da prova escrita objetiva realizada (rascunho de gabarito) e seus pertences pessoais.
7. Os três últimos candidatos da sala de provas devem nela permanecer até que o último deles entregue sua prova, assinando o termo respectivo e saindo juntos da sala.
8. As informações/instruções dadas no dia da prova complementam o edital.
9. Um exemplar do caderno de questões da prova escrita objetiva estará disponível no site FUNCCAMP (www.concursosfuncamp.com.br) e na Área do Candidato, o link “Anexos”, a partir das 16 horas do primeiro dia útil após a realização da prova.

**DURAÇÃO TOTAL DA PROVA, INCLUINDO
TRANSCRIÇÃO DAS INDICAÇÕES DE
GABARITO PARA O CARTÃO-RESPOSTA:
QUATRO HORAS**

Escreva seu nome completo de forma legível.

NOME: _____

ESPAÇO PARA RASCUNHO

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 1

A 8ª Conferência Nacional de Saúde alicerçada pelo Movimento da Reforma Sanitária foi um marco para a consolidação de um novo modelo de saúde para o Brasil.

Dentre as propostas a seguir, qual foi garantida na Constituição de 1988 por meio das discussões ocorridas na 8ª Conferência Nacional de Saúde?

- A) As condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.
- B) A saúde como um bem-estar físico, mental e social.
- C) Os determinantes sociais como modelo de atenção à saúde.
- D) A saúde como direito de todos e dever do estado.
- E) A atribuição do poder de decisão ao Ministério da saúde.

QUESTÃO 2

A regulação das ações e serviços de saúde, em todo o território nacional, está descrita na Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080/90.

Essa Lei mudou o modelo organizativo e assistencial de saúde no Brasil, pois:

- A) definiu um modelo hospitalocêntrico com investimentos em tecnologias e programas especiais de capacitação profissional para alcançar níveis de eficiência máximos.
- B) incluiu na gestão hospitalar a participação da comunidade como princípio para a tomada de decisões sobre as ações e serviços de saúde.
- C) centralizou a direção político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS) como responsabilidade da União.
- D) organizou um sistema piramidal com acesso centralizado em unidades de pronto atendimento.
- E) exigiu o acesso universal aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência com preservação da autonomia das pessoas.

QUESTÃO 3

Para efetivar formas e estratégias para produzir saúde, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) apresenta valores que devem ser assumidos pelos serviços de saúde.

No âmbito dos valores da PNPS, a solidariedade é entendida como:

- A) a divisão formal de tarefas entre instituições governamentais.
- B) a responsabilidade compartilhada entre profissionais de saúde e a gestão do serviço.
- C) o compromisso técnico com resultados mensuráveis na atenção à saúde.
- D) o sentimento que leva sujeitos e coletivos a se apoiarem mutuamente na construção de metas comuns.
- E) a exigência de uniformização das práticas de cuidados em toda rede de atenção à saúde.

QUESTÃO 4

A Estratégia Saúde da Família responsabiliza-se pela saúde da população com ações permanentes de vigilância em saúde.

Sobre a vigilância em saúde, é correto afirmar:

- A) A vigilância em saúde compreende ações de supervisão e monitoramento do trabalho dos profissionais de saúde, em especial, da equipe de técnicos.
- B) O conceito de Vigilância em Saúde exclui a vigilância e o controle doenças e agravos não transmissíveis.
- C) A vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde.
- D) A vigilância em saúde incorpora o planejamento de estratégias de intervenção clínica, com cirurgias e exames laboratoriais para orientar as atividades da equipe de saúde.
- E) O processo de territorialização assume baixa prioridade, já que é um processo destinado à atenção primária à saúde.

QUESTÃO 5

O Sistema Único de Saúde (SUS) vem se configurando como um arcabouço complexo de serviços organizados por meio de uma rede de atenção à saúde.

Assinale a alternativa que apresenta uma característica atual do SUS.

- A) Atenção à saúde fundamentada em ações curativas, urgentes e de alta tecnologia.
- B) Compromisso com a melhora de saúde da população, integração e articulação entre os serviços de atenção primária, secundária e terciária.
- C) Sistema universal, integral e com foco em políticas direcionadas aos menos favorecidos.
- D) Ênfase em unidades de pronto atendimento, vinte e quatro horas, como referência principal dentre os demais serviços da rede.
- E) Oferta contínua de serviços de telessaúde articulado às decisões clínicas e aos processos de regulação do acesso.

QUESTÃO 6

O acolhimento, enquanto tecnologia leve na Atenção Domiciliar (AD), tem como princípio fundamental:

- A) selecionar pacientes com maior vulnerabilidade clínica para atendimento prioritário.
- B) organizar o fluxo administrativo e burocrático de entrada no serviço.
- C) garantir acessibilidade universal e qualificar a relação trabalhador-usuário.
- D) determinar o tempo máximo de permanência dos pacientes na AD.
- E) executar triagem de risco de forma padronizada por protocolo.

QUESTÃO 7

Considerando que algumas políticas de saúde são transversais e se conectam para oferecer o melhor modelo de atenção à saúde às pessoas, como se dá a intersecção da Política Nacional de Promoção da saúde (PNPS) e a Política de Vigilância em Saúde (PNVS) no Sistema Único de Saúde?

- A) A intersecção ocorre quando os dados epidemiológicos são utilizados para subsidiar as ações de promoção da saúde voltadas à redução de vulnerabilidades e determinantes sociais.
- B) A intersecção se dá quando as ações de vigilância em saúde e as ações de promoção da saúde compartilham os mesmos objetivos e indicadores.
- C) As duas políticas estão presentes nos serviços de saúde, porém se apresentam de modo independente, uma voltada ao controle de doenças e a outra, à educação em saúde.
- D) A Política Nacional de Promoção da saúde orienta os serviços de atenção básica, enquanto a Política Nacional de Vigilância em saúde atua nos níveis secundários e terciários com articulação das suas ações.
- E) A relação entre as duas políticas depende da relação entre gestores. Na prática, as informações sobre promoção da saúde, prevenção e vigilância são cruzadas e descritas nos relatórios municipais.

QUESTÃO 8

Na classificação de pacientes em atenção domiciliar a “alta para AD1” representa um momento de transição importante na linha de cuidado.

Esta modalidade de alta ocorre quando:

- A) o paciente apresenta piora clínica, necessitando de encaminhamento hospitalar para suporte intensivo.
- B) o paciente atinge estabilidade e autonomia suficientes para ser acompanhado pelo serviço de atenção primária.
- C) a equipe de atenção domiciliar conclui o tratamento e encerra o acompanhamento sem necessidade de referenciar à rede de atenção à saúde.
- D) o cuidador formal passa a assumir integralmente o plano de cuidados, sem necessidade de monitoramento por um profissional.
- E) o usuário, Independentemente da sua condição clínica, recebe alta administrativa do serviço de atenção domiciliar.

QUESTÃO 9

Na atenção básica a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente, pressupõe a:

- A) Participação social.
- B) Longitudinalidade.
- C) Coordenação do cuidado.
- D) Integralidade.
- E) Resolutividade.

QUESTÃO 10

Com relação ao papel dos Pontos da rede de atenção à saúde na Política Nacional de Cuidados Paliativos, é correto afirmar:

- A) A atenção primária é responsável pela triagem de paciente elegíveis para o cuidado paliativo no território.
- B) Os serviços de urgência devem encaminhar os pacientes em cuidados paliativos para unidades hospitalares.
- C) A atenção hospitalar deve garantir o acolhimento, o controle de sintomas, a construção e revisão do plano avançado de cuidados durante o processo da doença e luto.
- D) O atendimento domiciliar é indicado quando a pessoa em cuidado paliativo não necessita de intervenções médicas.
- E) Os ambulatórios especializados participam de modo limitado da elaboração do plano terapêutico e, quando elegível ao cuidado paliativo, devem integrar o paciente à atenção primária à saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ENFERMEIRO

QUESTÃO 11

Com relação à visita domiciliar do enfermeiro ao binômio mãe e recém-nascido no contexto da família, assinale a alternativa correta.

- A) A visita domiciliar deve ocorrer exclusivamente no primeiro mês de vida, sendo dispensável após esse período.
- B) O foco da visita domiciliar é apenas aferir peso e temperatura do recém-nascido.
- C) A visita domiciliar é uma oportunidade para orientar a família sobre cuidados com o bebê, amamentação, vacinação, sinais de alerta e vínculo afetivo.
- D) A primeira consulta ao binômio pode ocorrer em domicílio, na visita domiciliar, mas deve ser realizada pelo médico.
- E) Não é necessário registrar informações da visita domiciliar, pois o acompanhamento já é feito na unidade de saúde.

QUESTÃO 12

Análise os objetivos a seguir.

- I. Assegurar o desenvolvimento da gestação.
- II. Permitir o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna.
- III. Ser iniciado precocemente, preferencialmente até 12 semanas de gestação.
- IV. Considerar o ambiente social, econômico, cultural e físico.

Conforme o Ministério da Saúde, são objetivos do acompanhamento do pré-natal:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13

No contexto do atendimento intra-hospitalar de um adulto em parada cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa correta.

- A) A cadeia de sobrevivência intra-hospitalar é composta por cinco elos.
- B) A assistolia requer desfibrilação imediata.
- C) A administração de epinefrina deve a cada 3 a 5 minutos.
- D) A profundidade das compressões torácicas deve ser inferior a 5 cm.
- E) A fibrilação ventricular é um rítmico não chocável.

QUESTÃO 14

Sobre o Processo de Enfermagem, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () Está organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas.
- () Os Sistemas de Linguagens Padronizadas são restritos a instituições que possuam prontuário eletrônico.
- () Deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todo contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de Enfermagem.
- () A responsabilidade pela prescrição de enfermagem pode ser compartilhada com o técnico de enfermagem.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F
- E) V V F F

QUESTÃO 15

Sobre cultura de segurança do paciente, assinale a alternativa correta.

- A) A cultura de segurança deve priorizar a responsabilização individual dos profissionais pelos incidentes, para garantir rigor e disciplina.
- B) A cultura de segurança deve ser construída com a participação ativa de todos os profissionais, promovendo ambiente não punitivo.
- C) A notificação de incidentes deve ser evitada para preservar a imagem da instituição e evitar sanções legais.
- D) O foco da cultura de segurança está exclusivamente na prevenção de erros médicos, desconsiderando falhas em outras áreas.
- E) A comunicação de eventos adversos deve ser restrita aos gestores, sem a participação dos profissionais diretamente envolvidos.

QUESTÃO 16

Analise as afirmativas a seguir, avaliando sua conformidade ética e legal, com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- I. É direito do profissional de Enfermagem exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental e autonomia e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos.
- II. É dever do profissional de Enfermagem orientar a pessoa e família sobre preparo, benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, respeitando o direito de recusa da pessoa ou de seu representante legal.
- III. É proibido administrar medicamentos sem conhecimento prévio de sua indicação, ação, via de administração e riscos, salvo em situações de urgência ou emergência em que não haja possibilidade de consulta prévia.
- IV. O profissional de enfermagem deve manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, podendo revelá-lo em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e IV, apenas.
- C) II, III e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II e IV, apenas.

QUESTÃO 17

Em relação às definições em segurança do paciente em serviços de saúde, assinale a alternativa que apresenta a definição correta.

- A) Evento adverso: comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção.
- B) Núcleo de segurança do paciente (NSP): instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente.
- C) Gestão de risco: conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança.
- D) Incidente: totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos para os fins a que se propõem.
- E) Qualidade em saúde: medidas específicas implementadas para prevenir incidentes e eventos adversos por meio de protocolos e listas de verificação padronizadas.

QUESTÃO 18

Análise as afirmativas a seguir sobre práticas seguras durante a transfusão de hemocomponentes.

- I. Antes do início da transfusão, é obrigatória a confirmação da identificação do receptor, do rótulo da bolsa, dos dados da etiqueta de liberação, validade do produto, realização de inspeção visual da bolsa e a verificação dos sinais vitais.
- II. A transfusão deve ser monitorada durante todo seu transcurso e deve ser acompanhada pelo profissional que a instalou durante os 10 (dez) primeiros minutos à beira do leito, e o tempo máximo de infusão não deve ultrapassar 4 (quatro) horas.
- III. O serviço de saúde que realiza procedimento transfusional deve manter, no prontuário do receptor: data; horário de início e término; sinais vitais no início e no término; origem e identificação das bolsas dos hemocomponentes transfundidos; registro de reações adversas, quando houver.
- IV. Os serviços de saúde que não possuam agências transfusionais em suas dependências, mas realizam a transfusão, devem manter registros que permitam a rastreabilidade dos hemocomponentes e dos procedimentos realizados.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

Análise as afirmativas a seguir relativas a acidentes de trabalho.

- I. Trata-se de evento súbito e inesperado devido a causas não naturais, que ocorrem com o trabalhador no exercício das suas atividades laborais.
- II. Podem ser de dois tipos: a) típico, quando ocorrem durante a execução das atividades laborais; ou b) de trajeto, quando ocorrem no percurso entre a residência e o trabalho.
- III. Os acidentes de trabalho podem ocasionar redução ou incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, da capacidade laboral, e óbito.
- IV. A notificação de acidente de trabalho é compulsória apenas nos casos de incapacidade permanente e fatais.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

Análise as afirmativas a seguir relativas à Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

- I. Esta lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado.
- II. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- III. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- IV. A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar, na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para a saúde.

Estão corretas as afirmativas:

- A) II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 21

Em relação à Lei 14.602/2023 – também chamada de “Lei do Descanso Digno da Enfermagem” – que altera a Lei nº 7.498/1986, sobre o exercício da enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) A lei exige que os locais de descanso para profissionais de enfermagem sejam compartilhados com outros trabalhadores da instituição para promover integração multidisciplinar.
- B) A lei torna obrigatória a oferta, por parte das instituições de saúde públicas e privadas, de ambientes adequados ao repouso dos profissionais de enfermagem durante o horário de trabalho.
- C) A lei restringe a aplicabilidade de tais espaços de descanso apenas aos enfermeiros de nível superior, excluindo técnicos, auxiliares e parteiras.
- D) A lei prevê a criação de um período de folga minimamente remunerado entre plantões, mas sem definição sobre as condições físicas do local de descanso.
- E) A lei permite que os profissionais utilizem qualquer local disponível, desde que possam descansar, sem especificação de condições como mobiliário ou conforto térmico.

QUESTÃO 22

No dimensionamento do quadro de profissionais de enfermagem, uma das variáveis consideradas é o Índice de Segurança Técnica (IST), fator de ajuste incorporado ao cálculo do quantitativo de pessoal para prever ausências e assegurar a continuidade da assistência.

O IST representa um percentual adicional destinado a compensar ausências previstas e imprevistas, como férias, licenças e faltas eventuais.

Com relação ao IST, assinale a alternativa correta.

- A) Deve ser de no mínimo 5%.
- B) Deve ser de no mínimo 10%.
- C) Deve ser de no mínimo 15%.
- D) Deve ser de no mínimo 20%.
- E) Deve ser de no mínimo 25%.

QUESTÃO 23

Em cuidado de alta dependência, quantas horas devem ser dispensadas, por paciente, em relação às horas de assistência durante o período de 24 horas?

- A) 18 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência.
- B) 16 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência.
- C) 14 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência.
- D) 12 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência.
- E) 10 horas de Enfermagem, por paciente, no cuidado de alta dependência.

QUESTÃO 24

Em relação à Pressão Arterial, assinale a alternativa correta.

- A) É determinada pelo volume sistólico e perfusão periférica.
- B) É determinada pela frequência cardíaca e resistência vascular pulmonar.
- C) É determinada pelo tempo de enchimento capilar e débito urinário.
- D) É determinada pelo débito cardíaco e resistência vascular periférica.
- E) É determinada pelo volume sistólico e volume diastólico.

QUESTÃO 25

Ao avaliar um paciente com cardiopatia chagásica, uma enfermeira identifica a frequência cardíaca de 54 batimentos por minuto.

Com relação ao valor da frequência cardíaca, pode-se afirmar que o paciente está com:

- A) bradipneia.
- B) bradicardia.
- C) bradifasia.
- D) bradicinesia.
- E) bradicinina.

QUESTÃO 26

Paciente com insuficiência cardíaca e presença de estertores na ausculta pulmonar apresenta dispnéia e cansaço.

Qual deve ser o posicionamento do paciente no leito nesta situação clínica?

- A) Posição litotômica.
- B) Posição de Trendelenburg.
- C) Posição de Fowler.
- D) Posição de Sims.
- E) Posição Prona.

QUESTÃO 27

Um paciente em cuidados intensivos requer as melhores práticas da equipe de enfermagem, com vista à manutenção da estabilidade clínica e prevenção de complicações.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando a finalidade com o respectivo nome do dispositivo utilizado em pacientes graves na terapia intensiva.

COLUNA I

1. Cateter Swan-Ganz
2. Cateter arterial
3. Balão intra-aórtico
4. Cateter de hemodiálise

COLUNA II

- () Dispositivo utilizado para aferir as pressões da artéria pulmonar.
- () Dispositivo utilizado para aferir a pressão arterial média.
- () Dispositivo utilizado para a assistência cardíaca.
- () Dispositivo utilizado para terapia renal substitutiva.

Assinale a sequência correta.

- A) 4 1 2 3
- B) 3 4 2 1
- C) 1 2 3 4
- D) 2 1 4 3
- E) 1 3 2 4

QUESTÃO 28

Ao enfermeiro cabe ensinar ao paciente sobre como promover uma expansão pulmonar ótima e consequente oxigenação sanguínea depois de uma anestesia.

A expansão pulmonar evita complicações pulmonares, como:

- A) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- B) Atelectasia.
- C) Epistaxe.
- D) Enfisema pulmonar.
- E) Bronquite crônica.

QUESTÃO 29

A troca gasosa adequada depende de uma razão ventilação-perfusão (V/Q) apropriada. O desequilíbrio na V/Q é resultado da ventilação inadequada ou da perfusão inadequada ou de ambas.

A esse respeito, relacione a COLUNA II com a COLUNA I, associando a situação clínica com seu respectivo conceito/característica.

COLUNA I

1. *Shunt*
2. Espaço morto
3. Unidade silenciosa

COLUNA II

- () A perfusão excede a ventilação, e o sangue passa pelos alvéolos sem que ocorra troca gasosa. Situação observada na pneumonia.
- () A ventilação excede a perfusão, e os alvéolos não têm suprimento sanguíneo adequado para que ocorra troca gasosa. Situação observada na embolia pulmonar.
- () A ventilação e a perfusão estão ausentes ou limitadas. Situação observada no pneumotórax.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 3 2
- B) 3 2 1
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3
- E) 1 2 3

QUESTÃO 30

Analisar as afirmativas a seguir relativas à atividade elétrica do coração e a eletrocardiografia (ECG).

- I. A despolarização atrial é um evento que leva à contração atrial.
- II. A despolarização ventricular é representada pelo complexo QRS.
- III. A repolarização nos átrios é representada pela onda P.
- IV. A repolarização ventricular é um evento que leva ao relaxamento dos ventrículos.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II, III e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que apresenta o marcador laboratorial mais sensível e precoce para avaliação da viabilidade gestacional.

- A) Estradiol.
- B) Progesterona sérica.
- C) Gonadotrofina coriônica (beta-hCG) quantitativa.
- D) Prolactina sérica.
- E) Proteína plasmática periférica.

QUESTÃO 32

A respeito do trauma de abdome, relacione a COLUNA II com a COLUNA I associando a situação clínica a suas respectivas características.

COLUNA I

1. Traumas contusos
2. Órgãos abdominais sólidos e vasculares
3. Traumas penetrantes
4. Órgãos abdominais ocos (intestino, vesícula e bexiga)

COLUNA II

- () Derramam seu conteúdo dentro da cavidade peritoneal ou no espaço retro peritoneal (peritonite; sepse).
- () Provocam lesão por meio da compressão de órgãos e do cisalhamento (ruptura dos órgãos sólidos ou vasos).
- () Sangram – podendo contribuir ou ser a causa primária de choque hipovolêmico.
- () Laceram ou cortam os órgãos abdominais no trajeto na lâmina ou do projétil.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 3 2 4
- B) 4 3 2 1
- C) 2 4 3 1
- D) 2 1 4 3
- E) 4 1 2 3

QUESTÃO 33

Com relação à dor isquêmica cardíaca, assinale a alternativa correta.

- A) Caracteriza-se por desconforto torácico de início no centro ou à esquerda do tórax, que alivia na inspiração.
- B) Caracteriza-se por sensação de aperto, pressão ou queimação, que pode ser localizado com a ponta do dedo.
- C) Apresenta mais desconforto do que dor e há presença do Sinal de Levine.
- D) Caracteriza-se por dor em facada, de início gradual e com aumento da intensidade em minutos.
- E) É decorrente do aumento de oferta de oxigênio nas coronárias cardíacas.

QUESTÃO 34

Com relação aos mecanismos fisiopatológicos do edema agudo pulmonar, assinale a alternativa correta.

- A) Há diminuição da pressão capilar hidrostática e diminuição da pressão oncótica plasmática.
- B) Há diminuição da pressão capilar hidrostática e aumento da pressão oncótica plasmática.
- C) Há aumento da pressão capilar hidrostática e diminuição da pressão oncótica plasmática.
- D) Há aumento da pressão capilar hidrostática e aumento da pressão oncótica plasmática.
- E) Não há alteração tanto na pressão capilar hidrostática quanto na pressão oncótica plasmática.

QUESTÃO 35

Paciente feminina, 75 anos de idade, sofreu queda domiciliar e foi atendida pela equipe de resgate. Encaminhada ao serviço hospitalar em decúbito dorsal na maca do resgate, apresentava decúbito elevado a 45° devido à dor intensa no ombro direito, o qual encontrava-se anteriorizado e com mobilidade reduzida. A avaliação clínica identificou luxação do ombro. Após múltiplas tentativas de redução sem sucesso, a paciente foi encaminhada ao Centro Cirúrgico.

Considerando esse caso clínico, assinale a alternativa correta.

- A) A paciente foi internada para realizar uma cirurgia eletiva e está no pré-operatório imediato.
- B) O enfermeiro deve, nesse ínterim, orientar a paciente sobre exercícios para prevenção de complicações pulmonares e cardiovasculares, utilizando este momento para demonstrar os exercícios a serem realizados no pós-operatório.
- C) Trata-se de uma cirurgia de urgência e, em razão de a paciente estar com muita dor, ela deve ser encaminhada imediatamente ao Centro Cirúrgico, não sendo necessária qualquer ação de enfermagem.
- D) Trata-se de uma cirurgia de urgência, a paciente encontra-se no pré-operatório imediato e o enfermeiro deve priorizar suas atividades para encaminhar a paciente rapidamente ao Centro Cirúrgico com segurança.
- E) O enfermeiro da unidade está dispensado de estabelecer contato com a equipe do Centro Cirúrgico sobre a paciente no pré-operatório dessa cirurgia de urgência.

QUESTÃO 36

Considerando o desequilíbrio ácido-básico, analise as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. Doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia e hemotórax são condições clínicas que levam à acidose respiratória.

PORQUE

- II. geram hiperventilação alveolar com retenção de dióxido de carbono (CO₂).

Nesse contexto, pode-se afirmar:

- A) I e II são verdadeiras, e II é uma justificativa da I.
- B) I e II são verdadeiras, mas II não é uma justificativa da I.
- C) I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) I é falsa, e II é verdadeira.
- E) I e II são falsas.

QUESTÃO 37

Uma criança de 20 kg deve receber dipirona 15 mg/kg/dose VO. A solução oral disponível é de 500 mg/mL.

Qual o volume, em mL, deve ser administrado por dose?

- A) 0,3 mL
- B) 0,6 mL
- C) 0,9 mL
- D) 1,2 mL
- E) 1,5 mL

QUESTÃO 38

Considerando a trombose venosa profunda e a tríade de Virchow, analise as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. Deambulação precoce, estímulo a exercícios ativos no leito, manutenção dos membros inferiores elevados e utilização de meia elástica são medidas que previnem a trombose venosa profunda.

PORQUE

- II. melhoram a perfusão periférica, aumentam a estase venosa e impedem a hipercoagulabilidade sanguínea.

Nesse contexto, pode-se afirmar:

- A) I e II são verdadeiras, e II é uma justificativa da I.
- B) I e II são verdadeiras, mas II não é uma justificativa da I.
- C) I é uma verdadeira, e II é falsa.
- D) I é falsa, e II é uma verdadeira.
- E) I e II são falsas.

QUESTÃO 39

Analise as afirmativas a seguir sobre quimioterapia antineoplásica.

- I. A quimioterapia adjuvante é realizada antes do procedimento cirúrgico, permitindo complementação terapêutica com a cirurgia.
- II. Os agentes quimioterápicos são agentes capazes de estimular o crescimento celular e são comumente tóxicos para o organismo.
- III. A mucosite é uma complicação da quimioterapia.
- IV. Drogas vesicantes são capazes de ocasionar necrose e lesão do tecido.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40

Foram prescritos 75 mg de cefalexina, via oral.

A cefalexina tem a seguinte apresentação: suspensão oral 250 mg/5 mL; e o frasco tem volume total de 100 mL.

Quantos mL devem ser administrados?

- A) 0,5 mL
- B) 1,0 mL
- C) 1,5 mL
- D) 10 mL
- E) 15 mL

QUESTÃO 41

Analisar as afirmativas a seguir sobre o processo de cicatrização da ferida.

- I. As fases inflamatória, proliferação e maturação compõem o processo de cicatrização.
- II. Na fase inflamatória, primeiro ocorre a hemostasia, por meio da vasoconstrição e formação de coágulo, e, em seguida, a vasodilatação para facilitar a chegada das células do sistema imunológico no local.
- III. Os macrófagos são responsáveis pela proliferação das bactérias e inibição dos fatores de crescimento – angiogênese.
- IV. Na fase da proliferação, os fibroblastos migram para o interior da ferida para preenchê-la.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e IV, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III, apenas.

QUESTÃO 42

A cicatrização é o processo pelo qual o organismo tende a reparar uma lesão ou perda de tecido. Esse processo pode ocorrer por: 1ª intenção, 2ª intenção e 3ª intenção.

Com relação ao processo de cicatrização, assinale a alternativa correta.

- A) 1ª intenção: há perda de tecido e as extremidades da pele ficam distantes uma das outras.
- B) 2ª intenção: não há perda de tecido e as bordas são aproximadas, por exemplo, por sutura.
- C) 3ª intenção: a ferida é mantida aberta e somente após o tratamento adequado deverá ser feito a aproximação das margens da ferida (pele e subcutâneo).
- D) 2ª intenção: a ferida não é capaz de formar tecido de granulação.
- E) 1ª intenção: é necessária formação de tecido de granulação para a epitelização.

QUESTÃO 43

Sr. Cláudio, 68 anos de idade, acamado, apresenta uma lesão por pressão em trocânter D. Ao avaliar a lesão, o enfermeiro identifica uma escara, 3 x 2 cm, seca, aderente, sem eritema, sem flutuação e sem odor.

Com relação ao caso descrito, assinale a alternativa correta.

- A) A alta exsudação da escara requer o uso de curativo de hidrofibra.
- B) O tecido necrótico precisa ser removido por desbridamento para permitir cicatrização.
- C) Os ácidos graxos essenciais é o produto mais indicado no tratamento.
- D) É recomendado manter a escara em meio seco para acelerar o processo de cicatrização.
- E) A presença de escara dispensa o uso de técnica asséptica para realizar o curativo.

QUESTÃO 44

Com relação ao exame citopatológico do colo do útero, a recomendação do Ministério da Saúde é fazer o exame:

- A) anualmente e, após três resultados negativos consecutivos, o intervalo pode ser estendido para dois anos.
- B) anualmente e, após dois resultados negativos consecutivos, o intervalo pode ser estendido para dois anos.
- C) anualmente, independentemente, de quaisquer resultados.
- D) anualmente e, após dois resultados negativos consecutivos, o intervalo pode ser estendido para três anos.
- E) anualmente e, após três resultados negativos consecutivos, o intervalo pode ser estendido para três anos.

QUESTÃO 45

Analisar as estratégias a seguir.

- I. Abordagem integral aos cuidados de saúde.
- II. Interrupção gestacional nos casos previstos em lei.
- III. Disponibilização de métodos contraceptivos.
- IV. Cuidado adequado durante a gestação, o parto e o puerpério.

São estratégias para a saúde sexual e reprodutiva, segundo o Ministério da Saúde:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 46

Analisar as afirmativas sobre a consulta de pré-natal.

- I. As consultas devem ser realizadas mensalmente até a 28ª semana, quinzenalmente até a 36ª semana, e semanalmente até o parto.
- II. A cada consulta deve-se incluir a avaliação de queixas e riscos, medição da pressão arterial, peso, altura uterina, batimentos cardíacos fetais e movimentos fetais.
- III. Os profissionais responsáveis pelo acompanhamento da gestante podem atualizar as informações na caderneta da gestante e no prontuário a cada trimestre.
- IV. As consultas subsequentes devem alternar entre enfermeira e médico, com uma gestão integrada do cuidado para cada gestante em seu território.

Conforme o Ministério da Saúde, estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 47

Analise os princípios a seguir.

- I. Evitar intervenções desnecessárias no parto, entendendo que o parto normal é um processo natural.
- II. Garantir o protagonismo da mulher no momento do parto.
- III. Respeitar a identidade de gênero e sexualidade da pessoa que está em trabalho de parto.
- IV. Seguir evidências científicas e normas técnicas atualizadas para a tomada de decisão no momento do parto.

Conforme o Ministério da Saúde, são princípios básicos da humanização do parto:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, II e IV, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 48

Analise as afirmativas a seguir sobre os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

- I. Atuam principalmente pela inibição da enzima ciclo-oxigenase (COX-1 e/ou COX-2), reduzindo a síntese de prostaglandinas.
- II. A ação anti-inflamatória, analgésica e antipirética são efeitos principais.
- III. São exemplos: ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nimesulida.
- IV. Apresentam inibição fraca e não seletiva da COX e participação de vias serotoninérgicas.

Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49

Com relação à Resolução COFEN Nº 754 de 16 de maio de 2024, que versa sobre prontuário eletrônico e registro de Enfermagem, assinale a alternativa correta.

- A) Cabe aos profissionais de Enfermagem adquirir os certificados digitais para assinatura.
- B) O enfermeiro deve registrar no prontuário do paciente as ações da sua equipe.
- C) No prontuário impresso pode ser omitida a identificação do profissional ou assinatura manual.
- D) As plataformas digitais utilizadas pela telenfermagem podem ser do setor público ou privado.
- E) Admite-se o uso de assinatura padronizada pela instituição como login e senha coletiva.

QUESTÃO 50

A respeito dos anti-hipertensivos, relacione a COLUNA II com a COLUNA I associando os fármacos à sua respectiva classe farmacológica.

COLUNA I

1. Inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA)
2. Bloqueadores dos receptores AT1 (BRA)
3. Bloqueadores dos canais de cálcio (BCC)
4. Betabloqueadores

COLUNA II

- () Valsartana, Losartana.
() Enalapril, Captopril.
() Amlodipino, Verapamil.
() Atenolol, Propranolol.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 3 2 4
- B) 4 3 2 1
- C) 2 4 3 1
- D) 2 1 3 4
- E) 4 1 2 3



Conforme a Lei nº 9.610/1998, é expressamente proibida a reprodução destas questões, total ou parcial, por qualquer meio, sem a prévia autorização da organizadora do concurso.