

TEST DE BISHOP

Valoración de la Madurez Cervical y Predicción del Éxito en la Inducción del Parto

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

Nº HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

PARÁMETROS DE EXPLORACIÓN CERVICAL

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Dilatación Cervical Diámetro del orificio cervical interno en cm	☐ Cerrado (0 cm) (0) ☐ 1 - 2 cm (1) ☐ 3 - 4 cm (2) ☐ ≥ 5 cm (3)	[]
2. Borramiento Cervical Longitud del cérvix acortada (%)	☐ 0 - 30% (cérvix grueso) (0) ☐ 40 - 50% (1) ☐ 60 - 70% (2) ☐ ≥ 80% (cérvix borrado) (3)	[]
3. Altura de la Presentación Plano de Hodge / Estación fetal (cm)	☐ -3 (feto libre / alto) (0) ☐ -2 (1) ☐ -1 / 0 (apoyado en espinas) (2) ☐ +1 / +2 (encajado / bajo) (3)	[]
4. Consistencia Cervical Firmeza del tejido al tacto vaginal	☐ Firme (como la punta de la nariz) (0) ☐ Media (como el mentón) (1) ☐ Blanda (como los labios) (2)	[]
5. Posición Cervical Orientación del cérvix respecto al eje pélvico	☐ Posterior (0) ☐ Media (1) ☐ Anterior (2)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 13 Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a Nº): _____)

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Cérvix Desfavorable / Inmaduro (≤ 5 puntos)

Indicación de maduración cervical (dinoprostona / misoprostol / balón de Foley).

Cérvix Intermedio (6 - 7 puntos)

Madurez equívoca. Reevaluar o considerar maduración mecánica leve frente a oxitocina.

Cérvix Favorable / Maduro (≥ 8 points)

Alta probabilidad de parto vaginal exitoso similar al trabajo de parto espontáneo. Iniciar oxitocina.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a Nº)

Fecha y Hora de Evaluación