

ESCALA BPS (BEHAVIORAL PAIN SCALE)

Evaluación del Dolor en Pacientes Críticos Adultos Intubados y Sedados

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

DOMINIOS CONDUCTUALES Y FISIOLÓGICOS

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Expresión Facial Tensión muscular y mueca facial	☐ Relajada: Cara completamente tranquila y neutra (1) ☐ Parcialmente tensa: Ceño fruncido, tensión facial leve (2) ☐ Totalmente tensa: Cierre palpebral fuerte, mueca profunda (3) ☐ Mueca de dolor: Cara distorsionada, mandíbula apretada, lágrimas (4)	[]
2. Movimiento de Miembros Superiores Postura y movimientos de defensa	☐ Sin movimiento: Brazos relajados en posición neutra (1) ☐ Parcialmente doblados: Flexión leve de codos o dedos (2) ☐ Totalmente doblados con flexión de dedos: Postura de defensa (3) ☐ Permanentemente retraídos: Flexión rígida y resistencia (4)	[]
3. Adaptación al Ventilador Mecánico Sincronía paciente-ventilador	☐ Tolerando la ventilación: Sin alarmas, respiración sincronizada (1) ☐ Tose pero tolera la ventilación: Tose, se adapta espontáneamente (2) ☐ Luchando contra el ventilador: Asincronía, alarmas frecuentes (3) ☐ Incapaz de controlar la ventilación: Lucha continua contra el ventilador (4)	[]

Guía de Titulación de Analgesia y Sedación en UCI: Evaluar BPS antes de procedimientos dolorosos (aspiración de secreciones, curaciones, cambios de posición) y 15-30 min post-intervención. Objetivo terapéutico en cuidados críticos: BPS $\leq$ 5. Si BPS $\geq$ 6, iniciar analgesia multimodal / titulación de opioides antes de aumentar sedantes.

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: 12 puntos (3 a 12))

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Sin Dolor / Aceptable (3 - 5 puntos)

Confort y analgesia adecuados. Mantener el esquema analgésico/sedante actual.

Dolor Leve a Moderado (6 - 7 puntos)

Evaluar al paciente; aplicar medidas de confort no farmacológicas o titular analgesia.

Dolor Severo / Malestar ($\geq$ 8 puntos)

Intervención analgésica inmediata requerida (bolus/titulación de opioide IV). Reevaluar en 15-30m.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación