

ESCALA CAM-ICU

Método para la Evaluación del Delirium en la Unidad de Cuidados Intensivos

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

CUATRO CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DEL CAM-ICU

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
Característica 1: Inicio Agudo o Curso Fluctante Cambio en el estado mental respecto al basal	☐ Sin cambio respecto al estado basal (0) ☐ Cambio agudo o curso fluctuante en las últimas 24 horas (1)	[]
Característica 2: Inatención (Prueba de Letras ASE) Prueba de apretar la mano al oír la letra 'A' en 'SAVEAHAART'	☐ 0 - 2 errores: Atención normal (0) ☐ > 2 errores: Inatención presente (1)	[]
Característica 3: Nivel de Conciencia Alterado Escala de Agitación y Sedación de Richmond (RASS)	☐ RASS actual = 0 (Alerta y tranquilo) (0) ☐ RASS actual distinto de 0 (ej. -3 a -1 o +1 a +4) (1)	[]
Característica 4: Pensamiento Desorganizado Preguntas lógicas simples y orden de 2 pasos	☐ 0 - 1 error en preguntas y sigue la orden correctamente (0) ☐ > 1 error en preguntas o incapaz de seguir la orden (1)	[]

Bundle ABCDEF de Prevención del Delirium en UCI: Avaluar y manejar el dolor | Both (Pruebas de respiración y despertar espontáneo) | Selección de sedantes (evitar benzodicepinas) | Delirium monitorizado por turno | Ejercicio y movilidad precoz | Familia involucrada y orientación diurna.

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: Delirium Positivo / Negativo)

Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°): _____

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Delirium Negativo (Caract. 1 o 2 Ausente)

Estado cognitivo normal en UCI. Mantener paquete de medidas preventivas de delirium.

Delirium Positivo (Caract. 1 y 2 Y (Caract. 3 o 4))

Delirium activo. Identificar etiología (fármacos, hipoxia, sepsis), movilizar y evitar benzodicepinas.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación