

TEST DE CAPURRO

Evaluación de la Edad Gestacional en el Recién Nacido (Somático y Neurológico)

1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre del Paciente: _____

Edad / Fecha Nac: _____

N° HC / ID: _____

Unidad / Servicio / Cama: _____

Cirugía / Diagnóstico: _____

Fecha / Hora: ____/____/____

CRITERIOS SOMÁTICOS Y NEUROLÓGICOS

Criterio / Parámetro	Opciones y Criterios de Puntuación	Puntos
1. Forma del Pabellón Auricular Incurvación del borde del pabellón	☐ Aplanado, sin forma, sin incurvación (0) ☐ Borde superior parcialmente incurvado (8) ☐ Toda la parte superior incurvada de forma definida (16) ☐ Pabellón totalmente incurvado, cartílago firme (24)	[]
2. Tamaño de la Glándula Mamaria Palpación del nódulo mamario	☐ Nódulo no palpable (0) ☐ Nódulo palpable < 5 mm de diámetro (5) ☐ Nódulo palpable entre 5 y 10 mm de diámetro (10) ☐ Nódulo palpable > 10 mm de diámetro (15)	[]
3. Formación del Pezón Elevación del pezón y punteado de la areola	☐ Apenas visible, sin areola (0) ☐ Pezón visible, areola plana y lisa (5) ☐ Areola elevada, borde no punteado (10) ☐ Areola elevada, borde punteado con botón definido (15)	[]
4. Textura de la Piel Inspección y palpación de la epidermis	☐ Muy fina, gelatinosa, lisa (0) ☐ Lisa, grosor medio, descamación superficial (10) ☐ Grietas superficiales, pálida, descamación en manos/pies (15) ☐ Apergaminada, grietas profundas (20)	[]
5. Pliegues Plantares Pliegues en la planta del pie al extender	☐ Sin pliegues visibles en la planta (0) ☐ Marcas rojas tenues en la mitad anterior (5) ☐ Pliegues definidos en la mitad anterior (10) ☐ Surcos profundos en más de la mitad anterior (15) ☐ Surcos profundos en toda la planta (20)	[]
6. Signo de la Bufanda (si somático+neuro) Posición del codo cruzado sobre el tórax	☐ El codo llega a la línea axilar opuesta (0) ☐ El codo entre la axila opuesta y la línea media (6) ☐ El codo llega a la línea media (12) ☐ El codo no llega a la línea media (18)	[]

PUNTUACIÓN TOTAL: [] PUNTOS (Máximo: Fórmula: **Evaluador (Enfermero/a Colegiado/a N°):** _____
[204 + Puntos] ÷ 7)

ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y CONDUCTAS DE ENFERMERÍA

Neonato Postérmino (≥ 42 semanas)

Riesgo de insuficiencia placentaria, vigilancia de meconio, glucemia neonatal.

Neonato a Término (37 - 41 semanas)

Neonato maduro. Alojamiento conjunto, contacto piel con piel, lactancia materna exclusiva.

Prematuro Moderado (32 - 36 semanas)

Soporte de termorregulación, evaluación de succión/deglución, fototerapia.

Prematuro Extremo (< 32 semanas)

Ingreso en UCIN, soporte respiratorio (surfactante), cuna radiante, mínima manipulación.

Firma y Sello del Enfermero/a Responsable (Colegiado/a N°)

Fecha y Hora de Evaluación